

重点課題の見える化のイメージ 参考資料

－都道府県の予防・健康に関する指標の現状－ (未定稿)

令和元年12月16日

内閣府政策統括官(経済社会システム担当)

(※1)本資料は、経済・財政一体改革推進委員会事務局(内閣府政策統括官(経済社会システム担当))が作成したものであって、関係省と未調整である。

(※2)本参考資料は、見える化のイメージを議論するために作成したものである。健康状態には様々な要因が影響を及ぼすものであり、科学的な知見に基づく適切な分析が必要であるとともに、十分なサンプル数が得られていない等のデータの信頼性の観点等から、都道府県間の単純な比較などについては留意が必要。

○関連指標の出所一覧

指標名称	時点	出所
健康寿命	2010、2013、2016年平均	厚労省「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会」資料
人口10万対年齢調整死亡率 （全死因、がん、虚血性心疾患、脳血管疾患、腎不全、 糖尿病性腎症、慢性閉そく性肺疾患、自殺）	2015年	厚労省「人口動態統計特殊報告」都道府県別年齢調整死亡率の概況
年齢調整済み要介護認定率 （要介護1～5計）	2018年度	厚労省「地域包括ケア見える化システム」、「介護保険事業状況報告」
人口100万対新規透析導入患者数	2017年	日本透析医学会「我が国の慢性透析療法の現状」各年の新規透析導入患者数（2012～2017）
メタボリックシンドローム、高血圧（収縮期140mmHg以上）、脂質異常症（LDL180mm/dL以上）、糖尿病（HbA1c6.5%以上）該当者割合	2016年度	厚労省「NDBオープンデータ」（第1回～第4回） 厚労省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」
特定健診受診率、特定保健指導実施率	2016年度	同上
がん検診受診率 （胃がん、大腸がん、肺がん）	2016年	国立がん研究センターがん情報サービス 「がん登録・統計」、厚労省「国民生活基礎調査」
野菜摂取量（20歳以上）、食塩摂取量（20歳以上）、 歩数の平均値（20～64歳）、BMI平均値（男20～69歳、 女40～69歳）、習慣的喫煙者（20歳以上）	2016年	厚労省「国民健康・栄養調査」
スポーツ行動者率（10歳以上）	2016年	総務省「社会生活基本調査」
一人平均むし歯数（12歳児）	2018年度	文科省「学校保健統計調査」
一人平均むし歯数（3歳児）	2017年度	厚労省「地域保健・健康増進事業報告」
年平均労働時間（月間） ※一人平均月間実労働時間数 （事業所規模5人以上）	2016年	厚労省「毎月勤労統計調査」
高齢者就業率 独居高齢者率	2015年	総務省「国勢調査」
人口10万対精神及び行動の障害 （気分〔感情〕障害〔躁うつ病を含む〕）の受療率	2016年	厚労省「患者調査」

（注 1） 都道府県別に収集可能な予防・健康に関する指標を取りまとめたもの。○内の数字は47都道府県の何番目に位置するかを表している。

（注 2） 熊本県は、2016年の数値が無い場合は、その直近の数値を便宜的に用いている。

北海道の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.04^{②⑥}
女性:73.78^{③⑨}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:505.4^{③⑤}
女性:265.5^{④⑩}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:184.6^{④④} 女性:99.5^{④⑥}

年齢調整済み要介護認定率
13.4%^{③⑦}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:25.2^{①⑥}
女性:9.5^{①⑧}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:34.7^{①③}
女性:21.0^{②④}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.2^{①⑤}
女性:1.1^{②⑦}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:9.8^{④⑥}
女性:5.2^{④⑤}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:5.8^{②③}
女性:3.2^{④③}

新規透析導入患者数(人口100万対)
354.1^{③⑤}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:15.59%^{③⑩}
予備群:11.91%^{②⑦}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:20.73%^{②⑨}
女性:15.01%^{②①}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.67%^{④⑥}
女性:4.99%^{③⑦}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.00%^{②①}
女性:4.08%^⑥

特定健診受診率
40.37%^{④⑦}

特定保健指導実施率
14.52%^{④④}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:43.77%^{③⑦}
女性:30.06%^{④③}
大腸がん
男性:42.35%^{③⑥}
女性:31.53%^{④⑤}
肺がん
男性:46.17%^{④⑩}
女性:32.51%^{④⑥}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:275.6g/日^{③⑤}
女性:279.8g/日^{①③}

食塩摂取量
男性:10.71g/日^{②④}
女性:9.11g/日^{②④}

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,381^{②④}
女性:6,051^{④①}

スポーツ行動者率
男性:70.6%^{③③}
女性:59.9%^{③④}

<肥満>
BMI平均値
男性:24.0^{③⑩}
女性:22.3^{①⑩}

<こころの健康>
人口10万対自殺死亡率
男性:24.7^{③⑩}
女性:9.5^{③⑦}
人口10万対気分障害受療率
98^{③⑩}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 148.1^{②①}

高齢者就業率
男性:50.70%^{③③}
女性:28.89%^{④②}

独居高齢者率
男性:13.62%^{③⑥}
女性:25.43%^{④③}

<たばこ>
習慣的喫煙者
男性:35.9%^{④④}

<歯の健康>
一人平均むし歯数(12歳児)
1.2^{④④}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.62^{③①}

青森県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.29^{④⑥}
女性:74.37^{②⑤}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:585.6^{④⑦}
女性:288.4^{④⑦}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:201.6^{④⑦} 女性:103.0^{④⑦}

年齢調整済み要介護認定率
14.2%^{④⑤}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:33.2^{③③}
女性:10.4^{②⑤}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:52.8^{④⑦}
女性:28.2^{④⑤}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.3^{③④}
女性:0.7^⑥

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:10.0^{④⑦}
女性:5.2^{④⑤}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:9.3^{④⑥}
女性:3.7^{④⑥}

新規透析導入患者数(人口100万対)
377.2^{④①}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:16.16%^{③⑨}
予備群:11.29%^⑦

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:19.71%^{②①}
女性:14.54%^{①⑤}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.37%^{④⑩}
女性:4.56%^{②⑩}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:10.89%^{④⑦}
女性:6.08%^{④⑥}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:48.93%^{①⑧}
女性:38.85%^{②⑩}
大腸がん
男性:48.93%^⑨
女性:41.55%^{①⑥}
肺がん
男性:55.00%^{①⑨}
女性:46.62%^{②②}

特定健診受診率
45.74%^{④⑩}

特定保健指導実施率
24.10%^{①⑥}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:318.7g/日^⑤
女性:299.7g/日^⑤

食塩摂取量
男性:11.27g/日^{④⑩}
女性:9.74g/日^{④④}

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,472^{②②}
女性:6,010^{④③}

スポーツ行動者率
男性:62.1%^{④⑦}
女性:50.7%^{④⑦}

<肥満>
BMI平均値
男性:24.5^{④③}
女性:23.2^{④②}

<こころの健康>
人口10万対自殺死亡率
男性:26.5^{③⑦}
女性:7.4^⑧
人口10万対気分障害受療率
91^{②③}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 152.5^{④③}

高齢者就業率
男性:51.12%^{②⑦}
女性:33.13%^{②⑧}

独居高齢者率
男性:10.94%^{①⑦}
女性:19.04%^{②④}

<たばこ>
習慣的喫煙者
男性:33.6%^{③⑧}

<歯の健康>
一人平均むし歯数(12歳児)
1.2^{④④}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.90^{④⑦}

岩手県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.65^④
女性:74.06^③

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:522.5^④
女性:268.1^④

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:167.3^③ 女性:90.3^③

年齢調整済み要介護認定率
13.3%^④

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:22.7^③
女性:7.2^⑥

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:51.8^④
女性:29.3^④

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.5^②
女性:1.0^②

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:7.4^②
女性:4.7^③

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.2^③
女性:2.7^③

新規透析導入患者数(人口100万対)
317.1^③

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:16.40%^④
予備群:11.45%^①

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:21.89%^④
女性:17.26%^④

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.22%^②
女性:3.60%^②

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:10.14%^③
女性:5.69%^④

特定健診受診率
52.05%^⑥

特定保健指導実施率
16.62%^③

<がん検診受診率>

胃がん
男性:52.71%^⑥
女性:41.73%^⑧
大腸がん
男性:51.26%^⑤
女性:47.48%^④
肺がん
男性:60.29%^⑤
女性:53.24%^⑤

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:299.1g/日^③
女性:286.1g/日^①

食塩摂取量
男性:10.74g/日^⑦
女性:9.25g/日^⑨

<身体活動・運動>

歩数
男性:6,626^④
女性:6,132^③

スポーツ行動者率
男性:65.1%^④
女性:56.4%^④

<肥満>

BMI平均値
男性:24.4^④
女性:22.6^④

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:27.5^④
女性:10.7^④
人口10万対気分障害受療率
128^④

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 154.5^⑥

高齢者就業率
男性:57.82%^④
女性:36.41%^④

独居高齢者率
男性:10.18%^②
女性:16.39%^②

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:30.9%^⑨

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.8^④
一人平均むし歯数(3歳児)
0.66^③

宮城県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.59^⑭
女性:74.15^⑲

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:471.7^⑪
女性:242.9^⑦

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:160.5^⑱ 女性:84.5^⑲

年齢調整済み要介護認定率
12.8%^⑳

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:25.5^⑬
女性:9.5^⑱

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:43.0^⑳
女性:23.7^㉑

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:6.5^④
女性:0.6^④

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.1^⑥
女性:3.7^⑩

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:4.5^⑧
女性:1.8^②

新規透析導入患者数(人口100万対)
279.8^⑩

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:17.62%^{④⑥}
予備群:12.20%^{③⑤}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:20.22%^{②④}
女性:15.11%^{②④}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.79%^⑫
女性:4.33%^⑪

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:10.61%^{④⑤}
女性:5.57%^{③⑨}

特定健診受診率
58.81%^③

特定保健指導実施率
18.09%^{③③}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:57.29%^③
女性:47.22%^③
大腸がん
男性:54.12%^②
女性:49.60%^②
肺がん
男性:62.79%^③
女性:56.15%^④

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:332.0g/日^③
女性:286.6g/日^⑩

食塩摂取量
男性:11.89g/日^{④⑦}
女性:9.42g/日^{③⑤}

<身体活動・運動>

歩数
男性:6,803^{④①}
女性:6,354^{③②}

スポーツ行動者率
男性:71.8%^{②⑧}
女性:61.2%^{②⑧}

<肥満>

BMI平均値
男性:24.6^{④④}
女性:23.2^{④①}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:23.4^{②②}
女性:8.3^⑱
人口10万対気分障害受療率
75^⑪

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 149.0^{②⑤}

高齢者就業率
男性:53.86%^⑮
女性:27.81%^{④④}

独居高齢者率
男性:11.30%^{②②}
女性:16.97%^⑮

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:31.1%^{③①}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
1.0^{③②}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.67^{③⑦}

秋田県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.79^{③⑦}
女性:74.65^⑱

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:540.3^{④⑥}
女性:266.4^{④①}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:185.8^{④⑤} 女性:97.7^{④⑤}

年齢調整済み要介護認定率
14%^{④④}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:17.5^⑤
女性:5.6^②

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:52.2^{④⑥}
女性:26.9^{④①}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:5.8^①
女性:0.4^②

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.3^{③⑦}
女性:4.3^{②⑨}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:5.8^{②③}
女性:2.9^{③⑦}

新規透析導入患者数(人口100万対)
269.1^⑦

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:17.30%^{④⑤}
予備群:11.59%^⑱

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:25.16%^{④⑦}
女性:18.46%^{④⑦}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.10%^①
女性:3.68%^③

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.45%^⑦
女性:4.49%^⑱

<がん検診受診率>

胃がん
男性:50.93%^⑫
女性:41.67%^⑨
大腸がん
男性:50.47%^⑥
女性:45.61%^⑥
肺がん
男性:56.54%^⑮
女性:50.44%^⑪

特定健診受診率
46.43%^{③⑦}

特定保健指導実施率
22.37%^{②②}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:282.6g/日^{②⑥}
女性:269.3g/日^{②④}

食塩摂取量
男性:11.57g/日^{④③}
女性:9.64g/日^{④②}

<身体活動・運動>

歩数
男性:6,626^{④⑥}
女性:6,541^{②⑤}

スポーツ行動者率
男性:65.9%^{④⑤}
女性:56.0%^{④⑤}

<肥満>
BMI平均値
男性:24.1^{③⑥}
女性:22.8^{②⑥}

<こころの健康>
人口10万対自殺死亡率
男性:30.3^{④⑦}
女性:9.7^{③⑨}
人口10万対気分障害受療率
87^⑱

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 151.1^{③⑧}

高齢者就業率
男性:53.61%^⑱
女性:32.43%^{③④}

独居高齢者率
男性:9.55%^⑦
女性:16.94%^⑭

<たばこ>
習慣的喫煙者
男性:32.7%^{③④}

<歯の健康>
一人平均むし歯数(12歳児)
0.7^⑮
一人平均むし歯数(3歳児)
0.68^{③⑧}

山形県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.58^⑰
女性:74.4^⑳

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:497.2^㉑
女性:246.8^⑳

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:162.5^㉒ 女性:81.8^⑪

年齢調整済み要介護認定率
12.5%^⑪

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:34.5^㉓
女性:11.1^㉔

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:43.8^㉕
女性:27.4^㉖

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.3^⑱
女性:0.8^⑪

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:9.3^㉗
女性:4.3^㉘

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:3.6^①
女性:1.8^③

新規透析導入患者数(人口100万対)
287.7^⑱

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:15.04%^㉙
予備群:10.95%^⑤

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:22.03%^㉚
女性:15.93%^{③①}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.62%^⑥
女性:4.18%^⑧

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.87%^⑱
女性:4.97%^㉛

<がん検診受診率>

胃がん
男性:66.38%^①
女性:58.19%^①
大腸がん
男性:61.57%^①
女性:58.19%^①
肺がん
男性:67.69%^①
女性:63.36%^①

特定健診受診率
61.18%^②

特定保健指導実施率
24.82%^⑫

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:277.3g/日^㉜
女性:273.0g/日^㉝

食塩摂取量
男性:11.02g/日^㉞
女性:9.81g/日^㉟

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,098^㉟
女性:5,893^㊱

スポーツ行動者率
男性:68.4%^㊲
女性:55.3%^㊳

<肥満>

BMI平均値
男性:23.7^㊴
女性:23.4^㊵

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:28.7^㊶
女性:8.3^㊷
人口10万対気分障害受療率
106^㊸

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 153.2^㊹

高齢者就業率
男性:57.77%^⑤
女性:36.73%^⑬

独居高齢者率
男性:8.47%^①
女性:12.39%^①

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:32.8%^㊺

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.5^④
一人平均むし歯数(3歳児)
0.66^㉞

福島県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.73^{③⑨}
女性:74.37^{②⑤}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:518.9^{④②}
女性:275.7^{④⑥}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:165.5^{②⑨} 女性:89.9^{③⑧}

年齢調整済み要介護認定率
13.2%^{②⑨}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:43.2^{④④}
女性:18.5^{④⑥}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:43.7^{③⑦}
女性:27.4^{④②}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.1^{③②}
女性:1.2^{③①}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.3^{③⑦}
女性:4.2^{②③}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.6^{③⑥}
女性:2.9^{③⑦}

新規透析導入患者数(人口100万対)
335.8^{③②}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:17.26%^{④④}
予備群:12.57%^{④⑤}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:21.25%^{③⑤}
女性:16.07%^{③②}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.09%^{②⑦}
女性:4.64%^{②③}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.98%^{②⑩}
女性:5.00%^{②⑨}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:54.85%^⑤
女性:46.10%^④
大腸がん
男性:47.57%^{①①}
女性:43.66%^⑧
肺がん
男性:57.28%^{①①}
女性:48.05%^{①⑧}

特定健診受診率
51.12%^{①⑧}

特定保健指導実施率
23.45%^{①⑦}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:346.9g/日^②
女性:314.3g/日^②

食塩摂取量
男性:11.89g/日^{④⑥}
女性:9.87g/日^{④⑥}

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,297^{②⑤}
女性:6,470^{②⑦}

スポーツ行動者率
男性:66.8%^{④③}
女性:59.4%^{③⑦}

<肥満>

BMI平均値
男性:24.8^{④⑥}
女性:23.9^{④⑦}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:27.4^{④④}
女性:10.3^{④④}
人口10万対気分障害受療率
84^{①⑦}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 154.6^{④⑦}

高齢者就業率
男性:54.46%^{①①}
女性:33.54%^{②④}

独居高齢者率
男性:12.26%^{②⑦}
女性:15.86%^{②⑨}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:35.2%^{④①}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.9^{②⑦}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.80^{④⑤}

茨城県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.83^⑦
女性:75.13^⑥

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:510.8^{③⑧}
女性:273.8^{④⑤}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:172.9^{③⑨} 女性:90.6^{④⑩}

年齢調整済み要介護認定率
12.6%^⑫

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:34^{③⑤}
女性:13.2^{③⑨}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:46.0^{④②}
女性:24.9^{③⑧}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.0^{③⑩}
女性:0.9^{①⑨}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.1^{③②}
女性:4.0^{①⑨}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.6^{③⑥}
女性:3.2^{④③}

新規透析導入患者数(人口100万対)
315.4^{②⑧}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:15.66%^{③①}
予備群:11.77%^{②③}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:18.58%^{①②}
女性:13.80%^⑦

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.94%^{②⑩}
女性:4.52%^{①⑨}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.90%^{③⑦}
女性:5.18%^{③④}

特定健診受診率
51.48%^{①⑦}

特定保健指導実施率
17.83%^{③⑥}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:47.38%^{②④}
女性:37.36%^{②③}
大腸がん
男性:44.59%^{②④}
女性:39.94%^{②③}
肺がん
男性:55.25%^{①⑦}
女性:46.70%^{②①}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:290.9g/日^{①⑧}
女性:274.2g/日^{②⑩}

食塩摂取量
男性:11.24g/日^{③⑦}
女性:9.44g/日^{③⑧}

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,445^{②③}
女性:6,471^{②⑥}

スポーツ行動者率
男性:73.0%^{①⑥}
女性:63.9%^{①④}

<肥満>

BMI平均値
男性:23.7^{①⑥}
女性:23.1^{③⑨}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:24.3^{②⑥}
女性:8.7^{②④}
人口10万対気分障害受療率
57^④

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 146.9^{①⑤}

高齢者就業率
男性:51.16%^{②⑥}
女性:31.34%^{③⑥}

独居高齢者率
男性:10.61%^{①⑤}
女性:14.90%^④

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:33.6%^{③⑦}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
1.0^{③②}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.61^{②⑧}

栃木県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.34^{②①}
女性:75.14^⑤

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:505.1^{③④}
女性:272.5^{④④}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:163.5^{②⑥} 女性:85.1^{②⑦}

年齢調整済み要介護認定率
12%^⑤

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:50.9^{④⑦}
女性:20.8^{④⑦}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:49.1^{④④}
女性:28.5^{④⑥}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.1^{①⑩}
女性:1.2^{③①}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.8^{④①}
女性:4.7^{③⑨}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.0^{②⑦}
女性:2.5^{②④}

新規透析導入患者数(人口100万対)
285.6^⑬

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:15.83%^{③⑤}
予備群:12.48%^{④②}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:20.67%^{②⑧}
女性:15.73%^{②⑨}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.89%^{①⑦}
女性:4.42%^{①⑤}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.13%^{②④}
女性:4.83%^{②⑤}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:46.44%^{②⑦}
女性:39.85%^{①⑤}
大腸がん
男性:46.44%^{①⑦}
女性:42.05%^{①④}
肺がん
男性:55.04%^{①⑧}
女性:48.66%^{①⑦}

特定健診受診率
49.59%^{②⑥}

特定保健指導実施率
21.91%^{②⑤}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:279.5g/日^{②⑨}
女性:277.2g/日^{①⑧}

食塩摂取量
男性:10.63g/日^{①⑨}
女性:9.02g/日^{①⑧}

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,582^{①⑨}
女性:6,583^{②③}

スポーツ行動者率
男性:73.5%^{①②}
女性:65.1%^{①⑧}

<肥満>
BMI平均値
男性:23.9^{②②}
女性:22.8^{③①}

<こころの健康>
人口10万対自殺死亡率
男性:23.6^{②④}
女性:11.1^{④⑦}
人口10万対気分障害受療率
52^③

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 149.3^{②⑦}

高齢者就業率
男性:51.75%^{②③}
女性:34.38%^{①⑦}

独居高齢者率
男性:11.17%^{②①}
女性:15.75%^{①⑧}

<たばこ>
習慣的喫煙者
男性:35.3%^{④②}

<歯の健康>
一人平均むし歯数(12歳児)
1.0^{③②}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.50^{②⑦}

群馬県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.59^⑭
女性:75.25^④

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:489.9^⑳
女性:261.1^㉑

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:161.9^㉒ 女性:84.4^⑰

年齢調整済み要介護認定率
13.1%^㉓

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:22.5^⑪
女性:8.3^⑬

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:39.5^㉔
女性:23.5^㉕

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:9.0^{④④}
女性:1.2^{③①}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:7.3^⑱
女性:3.5^⑦

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.6^㉖
女性:2.5^㉗

新規透析導入患者数(人口100万対)
374.0^{④⑤}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:15.78%^{③④}
予備群:11.72%^㉒

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:21.39%^㉓
女性:17.46%^{④②}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.00%^㉔
女性:4.61%^㉒

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:10.29%^{④②}
女性:6.18%^{④⑦}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:47.10%^㉖
女性:35.59%^{③①}
大腸がん
男性:44.08%^㉒
女性:36.32%^{③④}
肺がん
男性:57.43%^⑩
女性:49.15%^{①⑥}

特定健診受診率
50.64%^㉒

特定保健指導実施率
14.01%^{④⑥}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:279.8g/日^㉔
女性:261.7g/日^{③②}

食塩摂取量
男性:10.91g/日^㉒
女性:9.31g/日^{③①}

<身体活動・運動>

歩数
男性:6,964^㉓
女性:6,430^{③①}

スポーツ行動者率
男性:71.9%^㉖
女性:64.5%^⑩

<肥満>

BMI平均値
男性:24.1^㉓
女性:23.0^㉓

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:27.0^㉓
女性:10.9^{④⑥}
人口10万対気分障害受療率
51^②

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 148^⑰

高齢者就業率
男性:52.10%^⑰
女性:34.24%^⑱

独居高齢者率
男性:11.74%^㉔
女性:17.20%^⑱

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:37.3%^{④⑥}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.7^{①⑤}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.48^{①⑦}

埼玉県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.72^⑨
女性:73.95^{③④}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:485.2^{②①}
女性:261.7^{③⑥}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:164.6^{②⑦} 女性:87.4^{③①}

年齢調整済み要介護認定率
13.2%^{②⑨}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:43.9^{④⑤}
女性:17.9^{④④}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:36.7^{②⑤}
女性:20.9^{②③}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:6.8^⑦
女性:1.1^{②⑦}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:7.8^{②⑥}
女性:4.0^{①⑨}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:5.8^{②③}
女性:2.7^{③③}

新規透析導入患者数(人口100万対)
288.9^{①⑦}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.83%^{①⑨}
予備群:12.14%^{③④}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:19.44%^{①⑧}
女性:15.59%^{②⑦}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.16%^{③①}
女性:4.82%^{③①}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.39%^{②⑨}
女性:5.02%^{③⑩}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:42.43%^{④②}
女性:32.56%^{③⑧}
大腸がん
男性:42.76%^{③③}
女性:38.48%^{②⑦}
肺がん
男性:48.02%^{③⑥}
女性:38.74%^{③⑥}

特定健診受診率
52.30%^{①⑤}

特定保健指導実施率
14.40%^{④⑤}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:303.4g/日^{①①}
女性:295.1g/日^{②⑧}

食塩摂取量
男性:10.96g/日^{③⑩}
女性:9.43g/日^{③⑦}

<身体活動・運動>

歩数
男性:8,310^⑥
女性:6,880^{①⑤}

スポーツ行動者率
男性:76.3%^④
女性:68.9%^②

<肥満>

BMI平均値
男性:23.7^{①⑤}
女性:22.6^{②②}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:21.3^{①①}
女性:9.2^{③①}
人口10万対気分障害受療率
90^{②⑩}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 136.8^③

高齢者就業率
男性:51.93%^{②②}
女性:29.93%^{③⑨}

独居高齢者率
男性:12.61%^{③①}
女性:17.76%^{②⑩}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:28.2%^{①⑤}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.5^④
一人平均むし歯数(3歳児)
0.44^{①①}

千葉県の子防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.93^④
女性:74.43^{②②}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:477.2^{①⑥}
女性:258.3^{③②}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:159.3^{①①} 女性:85.1^{②①}

年齢調整済み要介護認定率
12.9%^{②⑦}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:27^{②②}
女性:10.1^{②③}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:35.8^{①⑥}
女性:21.7^{②⑧}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:6.2^②
女性:0.8^{①①}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.7^{①①}
女性:3.2^③

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:4.8^{①③}
女性:2.3^{①⑨}

新規透析導入患者数(人口100万対)
308.5^{②③}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.82%^{①⑧}
予備群:12.35%^{③⑨}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:18.24%^⑦
女性:14.61%^{①⑥}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.13%^{③①}
女性:4.79%^{②⑧}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.12%^{②③}
女性:4.48%^{①⑤}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:47.23%^{②⑤}
女性:36.86%^{②⑤}
大腸がん
男性:46.30%^{①⑧}
女性:42.67%^{①②}
肺がん
男性:52.77%^{②④}
女性:46.84%^{②①}

特定健診受診率
54.37%^⑨

特定保健指導実施率
16.39%^{③⑨}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:283.4g/日^{②⑤}
女性:284.2g/日^{①②}

食塩摂取量
男性:11.12g/日^{③⑤}
女性:9.71g/日^{④③}

<身体活動・運動>

歩数
男性:8,075^⑧
女性:7,086^⑨

スポーツ行動者率
男性:75.8%^⑤
女性:67.5%^④

<肥満>

BMI平均値
男性:23.9^{②⑤}
女性:22.5^{①⑦}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:23.3^{①⑨}
女性:9.5^{③⑦}
人口10万対気分障害受療率
129^{④④}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 139.8^⑥

高齢者就業率
男性:49.95%^{③⑦}
女性:29.60%^{④①}

独居高齢者率
男性:13.43%^{③⑥}
女性:18.68%^{②②}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:31.1%^{③①}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.6^⑧
一人平均むし歯数(3歳児)
0.49^{①⑧}

東京都の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.92^{③③}
女性:73.57^{④①}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:474.9^⑬
女性:245.9^⑬

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:163.0^{②④} 女性:88.9^{③⑤}

年齢調整済み要介護認定率
13.6%^{④①}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:42.5^{④②}
女性:16.0^{④②}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:35.7^{①⑤}
女性:19.4^{①⑤}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.4^{①⑨}
女性:1.1^{②⑦}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.3^⑧
女性:3.3^⑤

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:5.5^{①⑨}
女性:2.3^{①⑨}

新規透析導入患者数(人口100万対)
281.0^{①①}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:13.62%^③
予備群:11.61%^{②①}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:16.07%^①
女性:11.61%^①

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.00%^{②②}
女性:4.35%^{①②}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:7.92%^④
女性:3.73%^③

特定健診受診率
64.79%^①

特定保健指導実施率
15.59%^{④②}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:45.97%^{②⑨}
女性:35.39%^{③②}
大腸がん
男性:46.56%^{①⑥}
女性:40.51%^{②①}
肺がん
男性:49.19%^{③⑤}
女性:38.45%^{③⑦}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:275.5g/日^{③⑥}
女性:277.4g/日^{①⑥}

食塩摂取量
男性:11.03g/日^{③③}
女性:9.08g/日^{②①}

<身体活動・運動>

歩数
男性:8,611^④
女性:7,250^⑤

スポーツ行動者率
男性:78.5%^①
女性:73.0%^①

<肥満>
BMI平均値
男性:23.3^③
女性:22.2^⑨

<こころの健康>
人口10万対自殺死亡率
男性:21.2^⑧
女性:9.0^{②⑨}
人口10万対気分障害受療率
78^⑫

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 143.2^⑩

高齢者就業率
男性:52.32%^{①⑧}
女性:33.39%^{②⑤}

独居高齢者率
男性:19.68%^{④⑦}
女性:28.37%^{④⑥}

<たばこ>
習慣的喫煙者
男性:29.2%^{②①}

<歯の健康>
一人平均むし歯数(12歳児)
0.7^{①⑤}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.28^①

神奈川県 の 予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.59^⑭
女性:74.58^⑲

死亡・ 介護・ 重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:460.6^⑥
女性:248.7^⑱

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:159.4^⑫ 女性:89.6^⑳

年齢調整済み要介護認定率
13.4%^⑳

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:27.3^㉓
女性:8.7^⑭

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:36.6^⑲
女性:19.0^⑩

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:6.9^⑧
女性:1.6^⑤

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:5.5^③
女性:2.8^①

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:3.8^③
女性:1.9^⑦

新規透析導入患者数(人口100万対)
274.0^⑧

生活 習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:13.98%^⑧
予備群:12.01%^{③⑩}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:16.22%^②
女性:11.94%^②

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.30%^{③⑧}
女性:4.73%^{②⑦}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:7.37%^①
女性:7.27%^①

<がん検診受診率>

胃がん
男性:49.36%^⑮
女性:34.16%^{③④}
大腸がん
男性:47.01%^⑬
女性:37.14%^{②⑨}
肺がん
男性:52.62%^{②⑤}
女性:39.20%^{③⑤}

特定健診受診率
51.02%^⑲

特定保健指導実施率
13.56%^{④⑦}

生活習慣 ・ 社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:264.0g/日^{④⑤}
女性:303.6g/日^④

食塩摂取量
男性:10.45g/日^⑩
女性:9.24g/日^{②⑧}

<身体活動・運動>

歩数
男性:8,056^⑨
女性:7,795^①

スポーツ行動者率
男性:76.8%^③
女性:68.0%^③

<肥満>

BMI平均値
男性:23.4^⑦
女性:22.4^⑩

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:19.5^①
女性:9.7^{④⑩}
人口10万対気分障害受療率
93^{②⑤}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 139.5^⑤

高齢者就業率
男性:49.59%^{③⑨}
女性:29.11%^{④①}

独居高齢者率
男性:14.49%^{④②}
女性:21.72%^{③②}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:26.8%^⑧

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.5^④
一人平均むし歯数(3歳児)
0.38^⑦

新潟県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.28^{②③}
女性:74.67^{①⑦}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:487.8^{②③}
女性:243.5^⑧

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:168.5^{③③} 女性:83.0^{①⑤}

年齢調整済み要介護認定率
12.7%^{①⑤}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:22.6^{①②}
女性:7.4^{①⑩}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:47.7^{④③}
女性:25.4^{③⑨}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.2^{①⑤}
女性:0.7^⑥

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:5.6^④
女性:2.9^②

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:4.6^{①⑩}
女性:2.2^{①⑦}

新規透析導入患者数(人口100万対)
257.2^③

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.19%^{①①}
予備群:10.37%^①

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:19.87%^{②③}
女性:13.26%^④

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.76%^{①①}
女性:3.52%^①

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.16%^{②⑥}
女性:4.93%^{②⑦}

特定健診受診率
54.88%^⑦

特定保健指導実施率
21.65%^{②⑥}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:59.88%^②
女性:48.37%^②
大腸がん
男性:52.88%^④
女性:46.95%^⑤
肺がん
男性:64.40%^②
女性:56.30%^③

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:295.0g/日^{①④}
女性:291.2g/日^⑨

食塩摂取量
男性:11.25g/日^{③⑨}
女性:9.42g/日^{③⑥}

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,029^{③⑥}
女性:6,186^{③⑤}

スポーツ行動者率
男性:66.7%^{④④}
女性:58.7%^{④⑩}

<肥満>

BMI平均値
男性:23.1^①
女性:22.8^{③②}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:27.0^{③③}
女性:9.3^{③③}
人口10万対気分障害受療率
120^{③③}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 150.8^{③④}

高齢者就業率
男性:54.18%^{①③}
女性:33.03%^{②⑨}

独居高齢者率
男性:9.33%^⑤
女性:14.01%^②

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:29.9%^{②⑤}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.3^①
一人平均むし歯数(3歳児)
0.34^④

富山県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.39^⑳
女性:74.96^⑨

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:493.9^㉔
女性:246.6^⑮

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:170.2^㉕ 女性:84.4^⑰

年齢調整済み要介護認定率
13.6%^㉑

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:27.5^㉔
女性:8.1^⑫

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:43.6^㉕
女性:22.5^⑬

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.5^㉔
女性:0.5^⑬

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.2^㉔
女性:3.6^⑧

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:4.6^⑩
女性:2.5^㉔

新規透析導入患者数(人口100万対)
253.8^①

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:16.02%^㉔
予備群:11.58%^⑰

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:18.62%^⑭
女性:14.27%^⑫

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.87%^⑮
女性:4.50%^⑱

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:10.17%^㉑
女性:5.62%^㉑

<がん検診受診率>

胃がん
男性:52.53%^㉔
女性:43.23%^⑥
大腸がん
男性:47.00%^⑭
女性:43.67%^㉔
肺がん
男性:57.14%^⑫
女性:52.40%^⑥

特定健診受診率
57.15%^④

特定保健指導実施率
20.93%^㉔

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:291.0g/日^⑰
女性:263.1g/日^㉔

食塩摂取量
男性:10.96g/日^⑳
女性:8.94g/日^⑬

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,247^㉔
女性:6,074^㉕

スポーツ行動者率
男性:73.2%^⑮
女性:62.8%^⑱

<肥満>

BMI平均値
男性:23.4^⑥
女性:23.0^㉔

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:24.6^㉔
女性:9.7^㉔
人口10万対気分障害受療率
62^⑥

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 151.8^④

高齢者就業率
男性:56.13%^⑨
女性:38.00%^⑤

独居高齢者率
男性:8.76%^②
女性:14.98%^⑤

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:27.2%^⑩

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.7^⑮
一人平均むし歯数(3歳児)
0.45^⑬

石川県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.93^④
女性:74.79^⑭

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:473.2^⑫
女性:249.8^⑲

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:163.0^⑭ 女性:87.6^{③③}

年齢調整済み要介護認定率
12.7%^⑮

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:25.9^⑮
女性:9.5^⑮

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:36.0^⑮
女性:21.9^⑲

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:6.6^⑤
女性:0.7^⑥

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:4.5^①
女性:3.8^⑫

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:4.9^⑮
女性:1.9^⑦

新規透析導入患者数(人口100万対)
298.2^⑳

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:15.53%^⑳
予備群:11.38%^⑨

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:20.63%^㉑
女性:14.8%^⑮

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.49%^④
女性:3.72%^④

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:10.41%^{④④}
女性:5.36%^{③⑤}

特定健診受診率
54.79%^⑧

特定保健指導実施率
25.28%^⑨

<がん検診受診率>

胃がん
男性:51.50%^⑨
女性:38.67%^㉑
大腸がん
男性:45.49%^㉑
女性:39.06%^㉑
肺がん
男性:57.51%^⑨
女性:47.27%^⑲

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:312.6g/日^⑨
女性:255.7g/日^{③⑤}

食塩摂取量
男性:11.50g/日^{④②}
女性:9.16g/日^{②⑥}

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,254^{②⑧}
女性:6,465^⑲

スポーツ行動者率
男性:74.4%^⑨
女性:64.0%^⑮

<肥満>

BMI平均値
男性:23.9^㉑
女性:22.1^③

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:25.6^{③⑤}
女性:6.7^④
人口10万対気分障害受療率
110^{③④}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 150.5^㉑

高齢者就業率
男性:56.46%^⑧
女性:37.31%^⑨

独居高齢者率
男性:10.09%^⑪
女性:17.66%^⑲

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:29.1%^㉑

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.9^㉑
一人平均むし歯数(3歳児)
0.47^⑮

福井県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.84^⑥
女性:74.95^⑩

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:453.5^④
女性:241.2^⑥

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:150.5^③ 女性:86.6^⑦

年齢調整済み要介護認定率
12.9%^{②⑦}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:34.4^{③⑥}
女性:10.2^{②④}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:34.3^⑩
女性:17.9^⑥

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:6.9^⑧
女性:0.8^⑪

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:7.4^{②⑦}
女性:4.1^{②⑦}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.3^{③④}
女性:1.8^②

新規透析導入患者数(人口100万対)
286.3^⑭

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.94%^{②③}
予備群:11.87%^{②⑤}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:20.85%^{③①}
女性:15.05%^{②②}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.90%^{⑩⑧}
女性:4.40%^{⑭④}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.53%^⑧
女性:4.13%^⑨

<がん検診受診率>

胃がん
男性:48.75%^{①⑨}
女性:36.90%^{②④}
大腸がん
男性:45.00%^{②③}
女性:41.67%^{①⑤}
肺がん
男性:53.75%^{②③}
女性:45.24%^{②⑤}

特定健診受診率
51.01%^{②⑩}

特定保健指導実施率
24.77%^{⑬③}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:288.3g/日^{②①}
女性:268.7g/日^{②⑤}

食塩摂取量
男性:10.50g/日^{⑩②}
女性:9.10g/日^{②②}

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,551^{②⑩}
女性:6,732^{①⑨}

スポーツ行動者率
男性:70.1%^{③⑥}
女性:60.2%^{③③}

<肥満>

BMI平均値
男性:24.0^{②⑨}
女性:22.8^{②⑨}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:20.7^⑤
女性:5.4^①
人口10万対気分障害受療率
121^{③⑨}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 148.1^{②⑩}

高齢者就業率
男性:58.87%^②
女性:40.06%^②

独居高齢者率
男性:9.16%^③
女性:14.52%^③

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:36.6%^{④⑤}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
1.1^{④②}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.55^{②⑤}

山梨県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:72.31^①
女性:75.49^①

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:476.0^⑭
女性:253.6^⑮

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:152.9^⑤ 女性:86.1^⑭

年齢調整済み要介護認定率
12.3%^⑧

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:24.6^⑮
女性:8.8^⑮

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:42.0^⑮
女性:23.0^⑮

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.8^⑬
女性:0.8^⑪

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:7.7^⑮
女性:3.6^⑮

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:7.1^⑬
女性:2.3^⑮

新規透析導入患者数(人口100万対)
356.0^⑮

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.15%^⑩
予備群:11.51%^⑬

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:21.54%^⑮
女性:15.09%^⑮

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.12%^⑮
女性:4.16%^⑮

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.68%^⑮
女性:4.66%^⑮

<がん検診受診率>

胃がん
男性:55.68%^④
女性:45.66%^⑤
大腸がん
男性:53.41%^③
女性:49.13%^③
肺がん
男性:61.93%^④
女性:56.65%^②

特定健診受診率
56.87%^⑤

特定保健指導実施率
22.91%^⑮

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:317.8g/日^⑥
女性:299.7g/日^⑥

食塩摂取量
男性:11.06g/日^④
女性:9.38g/日^④

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,236^⑮
女性:6,838^⑮

スポーツ行動者率
男性:72.9%^⑮
女性:63.7%^⑮

<肥満>

BMI平均値
男性:24.0^⑮
女性:22.2^⑮

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:20.4^④
女性:8.0^⑮
人口10万対気分障害受療率
81^⑮

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 145.7^⑮

高齢者就業率
男性:56.71%^⑦
女性:38.56%^④

独居高齢者率
男性:12.37%^⑮
女性:18.67%^⑮

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:34.7%^⑮

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.9^⑮
一人平均むし歯数(3歳児)
0.62^⑮

長野県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.58^⑰
女性:74.48^⑳

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:434.1^①
女性:227.7^①

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:132.4^① 女性:76.6^②

年齢調整済み要介護認定率
11.2%^①

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:28.3^㉔
女性:9.6^㉔

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:41.0^㉔
女性:22.2^㉔

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.6^㉔
女性:0.8^⑪

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:5.7^⑤
女性:3.2^③

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:5.1^⑰
女性:2.1^⑭

新規透析導入患者数(人口100万対)
283.2^⑫

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:13.84%^⑥
予備群:10.52%^②

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:18.40%^⑪
女性:13.93%^⑩

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.66%^⑧
女性:4.09%^⑤

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.44%^⑥
女性:4.73%^⑱

特定健診受診率
55.98%^⑥

特定保健指導実施率
28.38%^⑤

<がん検診受診率>

胃がん
男性:52.33%^⑧
女性:39.01%^⑱
大腸がん
男性:49.53%^⑦
女性:42.83%^⑪
肺がん
男性:57.91%^⑦
女性:50.00%^⑬

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:352.0g/日^①
女性:335.3g/日^①

食塩摂取量
男性:11.77g/日^④
女性:10.11g/日^④

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,148^㉔
女性:6,606^㉔

スポーツ行動者率
男性:73.0%^⑰
女性:63.4%^⑰

<肥満>

BMI平均値
男性:24.3^④
女性:22.5^⑱

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:25.3^㉔
女性:8.7^④
人口10万対気分障害受療率
87^⑩

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 150^⑪

高齢者就業率
男性:60.08%^①
女性:41.63%^①

独居高齢者率
男性:10.19%^⑬
女性:15.95%^⑪

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:30.0%^⑦

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.6^⑧
一人平均むし歯数(3歳児)
0.40^⑧

岐阜県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.74^⑧
女性:74.88^⑫

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:476.3^⑮
女性:256.0^⑳

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:160.8^㉑ 女性:86.7^㉒

年齢調整済み要介護認定率
12.3%^⑧

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:30.6^㉓
女性:11.2^㉔

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:35.6^㉕
女性:19.8^㉖

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.1^㉗
女性:0.7^㉘

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:7.6^㉙
女性:3.8^㉚

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:3.9^㉛
女性:1.9^㉜

新規透析導入患者数(人口100万対)
306.8^㉝

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:13.30%^①
予備群:10.70%^③

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:19.50%^⑨
女性:14.85%^⑩

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.91%^⑪
女性:4.59%^⑫

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:7.90%^⑬
女性:4.13%^⑭

<がん検診受診率>

胃がん
男性:45.75%^⑮
女性:32.62%^⑯
大腸がん
男性:45.25%^⑰
女性:36.43%^⑱
肺がん
男性:51.50%^㉑
女性:40.71%^㉒

特定健診受診率
50.12%^㉓

特定保健指導実施率
25.07%^㉔

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:272.8g/日^①
女性:256.7g/日^②

食塩摂取量
男性:10.72g/日^③
女性:9.00g/日^④

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,990^⑤
女性:7,234^⑥

スポーツ行動者率
男性:73.3%^⑦
女性:61.9%^⑧

<肥満>

BMI平均値
男性:23.7^⑨
女性:22.6^⑩

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:24.4^⑪
女性:8.6^⑫
人口10万対気分障害受療率
69^⑬

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 141.8^⑭

高齢者就業率
男性:57.25%^⑮
女性:37.60%^⑯

独居高齢者率
男性:9.23%^⑰
女性:15.75%^⑱

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:27.3%^㉑

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.4^㉒
一人平均むし歯数(3歳児)
0.34^㉓

静岡県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:72.15^②
女性:75.43^②

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:480.2^{②⑩}
女性:252.1^{②⑩}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:158.0^⑨ 女性:81.3^⑩

年齢調整済み要介護認定率
12.1%^⑥

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:26^⑨
女性:9.5^⑩

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:44.5^{④⑩}
女性:23.3^{③⑤}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.1^⑩
女性:0.8^⑪

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.0^{②⑧}
女性:4.2^{②④}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:5.6^{②⑩}
女性:2.9^{③⑦}

新規透析導入患者数(人口100万対)
363.8^{③⑦}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:13.36%^②
予備群:10.92%^④

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:16.80%^③
女性:13.02%^③

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.7%^{④⑦}
女性:5.08%^{④⑩}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.15%^{②⑤}
女性:4.82%^{②④}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:47.80%^{②②}
女性:38.02%^{②②}
大腸がん
男性:45.67%^{①⑨}
女性:41.49%^{①⑦}
肺がん
男性:55.66%^{①⑥}
女性:49.48%^{①⑤}

特定健診受診率
54.14%^{①①}

特定保健指導実施率
19.35%^{③⑩}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:274.2g/日^{③⑦}
女性:242.8g/日^{④②}

食塩摂取量
男性:10.27g/日^⑦
女性:9.04g/日^{①⑨}

<身体活動・運動>

歩数
男性:8,676^②
女性:6,975^⑩

スポーツ行動者率
男性:72.4%^{②①}
女性:64.1%^{①②}

<肥満>

BMI平均値
男性:23.3^②
女性:22.3^{①③}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:25.3^{③③}
女性:8.0^{①⑤}
人口10万対気分障害受療率
61^⑤

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 147.6^{①⑧}

高齢者就業率
男性:54.18%^{①②}
女性:37.24%^{①⑩}

独居高齢者率
男性:11.03%^{②⑩}
女性:15.68%^⑥

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:28.6%^{①⑧}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.4^②
一人平均むし歯数(3歳児)
0.32^②

愛知県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:72.15^③
女性:75.3^③

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:467.9^⑨
女性:260.2^{③④}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:159.4^⑫ 女性:89.4^{③⑥}

年齢調整済み要介護認定率
12.2%^⑦

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:26.3^{②⑦}
女性:11.6^{③②}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:34.2^⑩
女性:20.7^{②①}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:6.2^②
女性:0.9^⑩

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:7.3^⑩
女性:3.8^⑫

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:4.3^⑥
女性:2.2^{①⑦}

新規透析導入患者数(人口100万対)
259.7^⑥

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.54%^⑮
予備群:11.42%^⑩

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:18.75%^⑮
女性:15.56%^{②⑥}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.07%^{②⑥}
女性:4.80%^{②⑨}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.68%^⑬
女性:4.83%^{②⑥}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:44.22%^{③④}
女性:36.60%^{②⑦}
大腸がん
男性:42.88%^{③②}
女性:40.23%^{②②}
肺がん
男性:49.66%^{③③}
女性:40.77%^{③⑩}

特定健診受診率
53.09%^⑭

特定保健指導実施率
20.28%^{②⑨}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:228.8g/日^{④⑦}
女性:237.7g/日^{④⑤}

食塩摂取量
男性:10.58g/日^{①⑦}
女性:9.32g/日^{③②}

<身体活動・運動>

歩数
男性:8,035^⑩
女性:6,077^{③⑦}

スポーツ行動者率
男性:75.4%^⑥
女性:66.9%^⑤

<肥満>

BMI平均値
男性:23.3^④
女性:22.9^{③④}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:20.2^②
女性:7.8^{①①}
人口10万対気分障害受療率
90^{②⑩}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 144.6^{①①}

高齢者就業率
男性:51.96%^{②①}
女性:33.88%^{②③}

独居高齢者率
男性:12.32%^{②⑧}
女性:18.89%^{②③}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:27.5%^⑫

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.5^④
一人平均むし歯数(3歳児)
0.32^③

三重県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.4^⑱
女性:75.02^⑦

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:488.3^{②④}
女性:258.1^{③①}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:160.7^{①⑨} 女性:81.1^⑨

年齢調整済み要介護認定率
13.3%^{③④}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:31.8^{③②}
女性:12.4^{③⑦}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:37.1^{②②}
女性:23.1^{③④}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.4^{③⑥}
女性:1.0^{②③}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.2^{③⑤}
女性:4.2^{②④}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.5^{③⑤}
女性:2.9^{③⑦}

新規透析導入患者数(人口100万対)
310.0^{②④}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.78%^{①⑦}
予備群:11.57%^{①⑥}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:18.37%^⑨
女性:15.91%^{③⑩}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.00%^{②③}
女性:4.88%^{③④}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.06%^{②②}
女性:4.80%^{②②}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:45.07%^{③②}
女性:36.13%^{②⑧}
大腸がん
男性:44.51%^{②⑥}
女性:40.58%^{②⑨}
肺がん
男性:49.86%^{③①}
女性:41.88%^{②⑧}

特定健診受診率
54.24%^{①⑩}

特定保健指導実施率
19.05%^{③②}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:268.7g/日^{④④}
女性:239.8g/日^{④④}

食塩摂取量
男性:10.68g/日^{②①}
女性:9.00g/日^{①⑦}

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,119^{③③}
女性:6,460^{③⑩}

スポーツ行動者率
男性:72.3%^{②②}
女性:61.7%^{②⑦}

<肥満>

BMI平均値
男性:23.5^⑧
女性:22.3^{①②}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:24.6^{②⑧}
女性:8.8^{②⑦}
人口10万対気分障害受療率
96^{②⑨}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 145.7^{①②}

高齢者就業率
男性:52.01%^{②⑩}
女性:34.12%^{②⑩}

独居高齢者率
男性:10.72%^{①⑥}
女性:19.15%^{②⑤}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:35.1%^{④⑩}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
1.0^{③②}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.54^{②②}

滋賀県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.31^{②②}
女性:73.4^{④④}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:437.9^②
女性:240.8^⑤

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:149.1^② 女性:82.9^{④④}

年齢調整済み要介護認定率
13.1%^{②⑤}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:30.4^⑦
女性:11.7^{③③}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:26.4^①
女性:17.1^②

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.5^{③⑧}
女性:1.0^{②③}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.7^{①①}
女性:3.8^{①②}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:4.4^⑦
女性:2.0^{①①}

新規透析導入患者数(人口100万対)
292.3^{①⑧}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:13.90%^⑦
予備群:11.58%^{①⑧}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:18.01%^⑥
女性:14.90%^{②⑩}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.38%^{④①}
女性:4.89%^{③⑤}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:7.70%^②
女性:3.71%^②

特定健診受診率
51.00%^{②①}

特定保健指導実施率
22.83%^{①⑨}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:49.64%^{④④}
女性:34.83%^{③③}
大腸がん
男性:47.46%^{④②}
女性:39.66%^{②④}
肺がん
男性:52.54%^{②⑥}
女性:39.31%^{③④}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:269.3g/日^{④②}
女性:240.2g/日^{④③}

食塩摂取量
男性:10.10g/日^⑤
女性:8.70g/日^⑦

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,760^{①⑥}
女性:7,292^④

スポーツ行動者率
男性:76.9%^②
女性:66.5%^⑥

<肥満>

BMI平均値
男性:23.9^{②④}
女性:22.1^④

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:22.2^{①⑤}
女性:9.1^{③⑩}
人口10万対気分障害受療率
78^{④②}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 143^⑨

高齢者就業率
男性:51.49%^{②④}
女性:31.00%^{③⑦}

独居高齢者率
男性:9.67%^⑧
女性:15.88%^{①⑩}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:20.6%^①

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.6^⑧
一人平均むし歯数(3歳児)
0.46^{④④}

京都府の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.82^{③⑥}
女性:73.53^{④③}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:455.1^⑤
女性:245.4^⑫

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:159.5^⑭ 女性:85.1^⑳

年齢調整済み要介護認定率
14.5%^{④⑥}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:39.3^{④①}
女性:15.9^{④①}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:33.1^④
女性:18.8^⑧

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.4^{①⑨}
女性:1.3^{④①}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:7.3^{①⑧}
女性:3.9^{①⑥}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:4.0^⑤
女性:2.3^{①⑨}

新規透析導入患者数(人口100万対)
258.6^⑤

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:13.71%^④
予備群:11.55%^⑮

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:17.84%^④
女性:13.86%^⑧

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.28%^{③④}
女性:4.71%^{②⑤}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.53%^⑨
女性:4.17%^{①①}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:41.54%^{④④}
女性:29.68%^{④⑤}
大腸がん
男性:40.38%^{④①}
女性:33.75%^{④①}
肺がん
男性:46.15%^{④①}
女性:36.75%^{④②}

特定健診受診率
48.37%^{②⑧}

特定保健指導実施率
16.32%^{④①}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:287.9g/日^{②②}
女性:253.8g/日^{③⑦}

食塩摂取量
男性:10.75g/日^{②⑧}
女性:8.98g/日^{①⑤}

<身体活動・運動>

歩数
男性:8,572^⑤
女性:7,524^②

スポーツ行動者率
男性:74.0%^{①①}
女性:66.4%^⑦

<肥満>
BMI平均値
男性:23.4^⑤
女性:22.0^②

<こころの健康>
人口10万対自殺死亡率
男性:21.2^⑧
女性:8.8^⑦
人口10万対気分障害受療率
90^{②①}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 138.2^④

高齢者就業率
男性:53.89%^{①④}
女性:32.56%^{③③}

独居高齢者率
男性:13.80%^{④①}
女性:23.64%^{③⑥}

<たばこ>
習慣的喫煙者
男性:30.6%^{②⑧}

<歯の健康>
一人平均むし歯数(12歳児)
0.6^⑧
一人平均むし歯数(3歳児)
0.45^⑫

大阪府の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.45^{④④}
女性:73.17^{④⑥}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:516.3^{④①}
女性:263.7^{③⑦}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:181.3^{④③} 女性:93.0^{④③}

年齢調整済み要介護認定率
15.1%^{④⑦}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:44.3^{④⑥}
女性:17.4^{④③}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:33.2^⑤
女性:16.6^①

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.5^{③⑧}
女性:1.2^{③①}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.1^{③②}
女性:5.0^{④④}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.0^{②⑦}
女性:2.8^{③⑤}

新規透析導入患者数(人口100万対)
311.9^{②⑤}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.09%^⑨
予備群:12.35%^{③⑧}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:18.34%^⑧
女性:13.89%^⑨

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.45%^{④②}
女性:5.07%^{③⑨}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.72%^{①⑤}
女性:4.13%^{①⑩}

特定健診受診率
46.96%^{③④}

特定保健指導実施率
15.36%^{④③}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:39.02%^{④⑥}
女性:28.91%^{④⑥}
大腸がん
男性:36.73%^{④⑤}
女性:32.28%^{④④}
肺がん
男性:41.20%^{④⑦}
女性:31.96%^{④⑦}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:253.5g/日^{④⑥}
女性:226.8g/日^{④⑦}

食塩摂取量
男性:9.90g/日^③
女性:8.36g/日^②

<身体活動・運動>

歩数
男性:8,762^①
女性:7,186^⑦

スポーツ行動者率
男性:72.0%^{②④}
女性:62.2%^{②⑩}

<肥満>

BMI平均値
男性:24.0^{③①}
女性:22.7^{②⑤}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:23.3^{①⑨}
女性:9.2^{③①}
人口10万対気分障害受療率
70^⑨

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 141.8^⑦

高齢者就業率
男性:47.02%^{④⑤}
女性:27.68%^{④⑤}

独居高齢者率
男性:17.92%^{④⑥}
女性:26.62%^{④⑤}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:29.3%^{②②}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.7^{①⑤}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.54^{②④}

兵庫県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.88^{③④}
女性:73.56^{④②}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:477.8^{①⑦}
女性:255.5^{②⑥}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:167.3^{③②} 女性:88.7^{③④}

年齢調整済み要介護認定率
12.7%^⑮

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:30.7^{②⑨}
女性:11.7^{③③}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:36.9^{②①}
女性:19.1^{①②}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.9^{②⑦}
女性:1.3^{④①}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.9^{①⑥}
女性:4.3^{②⑨}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.0^{②⑦}
女性:2.6^{③②}

新規透析導入患者数(人口100万対)
276.8^⑨

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.47%^{①④}
予備群:11.81%^{②④}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:18.75%^{①⑤}
女性:14.01%^{①①}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.23%^{③③}
女性:5.26%^{④②}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.86%^{①⑦}
女性:4.37%^{①③}

特定健診受診率
47.87%^{③②}

特定保健指導実施率
16.13%^{④①}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:43.59%^{③⑧}
女性:28.80%^{④⑦}
大腸がん
男性:44.04%^{②⑧}
女性:35.81%^{③⑥}
肺がん
男性:47.50%^{③⑦}
女性:34.56%^{④④}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:293.9g/日^{①⑤}
女性:261.9g/日^{③①}

食塩摂取量
男性:10.48g/日^{①①}
女性:9.10g/日^{②③}

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,782^{①⑤}
女性:6,813^{①⑦}

スポーツ行動者率
男性:75.4%^⑥
女性:64.2%^{①①}

<肥満>
BMI平均値
男性:23.8^{①⑨}
女性:22.4^{①④}

<こころの健康>
人口10万対自殺死亡率
男性:20.7^⑤
女性:9.9^{④②}
人口10万対気分障害受療率
78^⑫

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 136.7^②

高齢者就業率
男性:47.76%^{④②}
女性:27.24%^{④⑥}

独居高齢者率
男性:13.56%^{③⑦}
女性:23.71%^{③⑦}

<たばこ>
習慣的喫煙者
男性:25.8%^④

<歯の健康>
一人平均むし歯数(12歳児)
0.6^⑧
一人平均むし歯数(3歳児)
0.42^⑩

奈良県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.94^{③②}
女性:73.85^{③⑥}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:452.9^③
女性:243.9^⑩

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:160.0^⑩ 女性:82.3^⑬

年齢調整済み要介護認定率
12.8%^{②⑩}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:19.9^⑧
女性:6.9^④

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:29.0^②
女性:17.8^⑤

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.4^⑩
女性:0.6^④

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:5.0^②
女性:3.7^⑩

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:3.6^①
女性:2.5^{②④}

新規透析導入患者数(人口100万対)
286.4^⑮

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.23%^⑫
予備群:12.33%^{③⑦}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:18.87%^⑮
女性:14.30%^⑬

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.30%^{③⑦}
女性:5.60%^{④⑥}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.77%^⑮
女性:3.98%^④

特定健診受診率
44.01%^{④③}

特定保健指導実施率
16.84%^{③⑦}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:41.85%^{④③}
女性:31.17%^{④②}
大腸がん
男性:41.11%^{③⑧}
女性:36.69%^{③⑩}
肺がん
男性:45.19%^{④④}
女性:32.79%^{④⑤}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:279.1g/日^{③①}
女性:263.5g/日^{②⑦}

食塩摂取量
男性:10.56g/日^{④④}
女性:9.22g/日^{②⑦}

<身体活動・運動>

歩数
男性:8,631^③
女性:6,787^⑩

スポーツ行動者率
男性:74.7%^⑧
女性:64.9%^⑨

<肥満>

BMI平均値
男性:23.7^{④④}
女性:22.3^{④①}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:21.1^⑦
女性:7.6^⑨
人口10万対気分障害受療率
65^⑦

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 134.5^①

高齢者就業率
男性:47.61%^{④④}
女性:23.88%^{④⑦}

独居高齢者率
男性:9.95%^⑨
女性:19.33%^{②⑥}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:22.0%^②

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.7^⑮
一人平均むし歯数(3歳児)
0.58^{②⑥}

和歌山県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.07^{②⑤}
女性:74.05^{③③}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:520.7^{④④}
女性:268.9^{④③}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:176.2^{④②} 女性:86.7^{②⑧}

年齢調整済み要介護認定率
13.6%^{④①}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:43^{④③}
女性:18.2^{④⑤}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:32.4^③
女性:19.5^{①⑥}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:10.0^{④⑥}
女性:1.1^{②⑦}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.8^{④①}
女性:4.7^{③⑨}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:4.9^{①⑤}
女性:2.4^{②③}

新規透析導入患者数(人口100万対)
364.0^{③⑧}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:16.01%^{③⑦}
予備群:12.51%^{④③}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:24.03%^{④⑥}
女性:17.91%^{④③}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.67%^{④⑤}
女性:5.97%^{④⑦}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.86%^{③⑥}
女性:5.16%^{③③}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:43.15%^{④①}
女性:33.94%^{③⑤}
大腸がん
男性:39.09%^{④③}
女性:34.39%^{④①}
肺がん
男性:47.21%^{③⑧}
女性:40.27%^{③②}

特定健診受診率
41.39%^{④⑥}

特定保健指導実施率
22.77%^{②①}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:280.4g/日^{②⑦}
女性:232.4g/日^{④⑥}

食塩摂取量
男性:10.62g/日^{①⑧}
女性:8.83g/日^{①①}

<身体活動・運動>

歩数
男性:6,743^{④③}
女性:6,062^{③⑨}

スポーツ行動者率
男性:69.1%^{③⑨}
女性:58.7%^{④①}

<肥満>

BMI平均値
男性:23.9^{②①}
女性:22.5^{②①}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:26.2^{③④}
女性:6.7^④
人口10万対気分障害受療率
71^{①①}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 145.9^{①④}

高齢者就業率
男性:50.92%^{③①}
女性:33.32%^{②⑦}

独居高齢者率
男性:13.64%^{③⑨}
女性:24.29%^{④②}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:29.7%^{②④}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.9^{②⑦}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.72^{④①}

鳥取県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.87^{③⑤}
女性:73.95^{③④}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:518.9^{④②}
女性:246.4^{①④}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:185.8^{④⑥} 女性:87.1^{③⑩}

年齢調整済み要介護認定率
12.3%^⑧

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:31.1^{③⑩}
女性:12.7^{③⑧}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:45.0^{④①}
女性:22.9^{③②}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.2^{①⑤}
女性:0.3^①

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.8^{①③}
女性:4.3^{②⑨}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:9.3^{④⑥}
女性:2.1^{①④}

新規透析導入患者数(人口100万対)
258.4^④

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:13.81%^⑤
予備群:11.53%^{①④}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:22.71%^{④③}
女性:18.12%^{④⑤}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.28%^{③⑤}
女性:5.05%^{③⑧}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.27%^⑤
女性:4.01%^⑤

特定健診受診率
48.07%^{③①}

特定保健指導実施率
22.18%^{②③}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:48.67%^{②⑩}
女性:41.32%^{①⑩}
大腸がん
男性:46.90%^{①⑤}
女性:42.15%^{①③}
肺がん
男性:57.52%^⑧
女性:50.41%^{①②}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:288.8g/日^{②⑩}
女性:278.0g/日^{①④}

食塩摂取量
男性:10.33g/日^⑧
女性:8.90g/日^{①②}

<身体活動・運動>

歩数
男性:6,698^{④④}
女性:5,857^{④⑥}

スポーツ行動者率
男性:71.3%^{③①}
女性:59.6%^{③⑥}

<肥満>

BMI平均値
男性:23.7^{①①}
女性:22.1^⑥

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:24.1^{②⑤}
女性:6.8^⑥
人口10万対気分障害受療率
127^{④②}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 151.3^{④⑩}

高齢者就業率
男性:52.93%^{①⑦}
女性:37.16%^{①①}

独居高齢者率
男性:10.29%^{①④}
女性:17.00%^{①⑥}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:32.7%^{③③}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.7^{①⑤}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.34^⑤

島根県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.04^{②⑥}
女性:74.73^⑮

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:492.6^{②⑦}
女性:236.9^②

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:172.6^{③⑥} 女性:79.7^⑤

年齢調整済み要介護認定率
13%^{②④}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:16.2^②
女性:6.9^④

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:38.5^{②⑤}
女性:21.3^{②⑦}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.5^{③⑧}
女性:0.9^⑮

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.8^⑮
女性:3.3^⑤

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:4.8^⑮
女性:1.7^①

新規透析導入患者数(人口100万対)
256.9^②

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.75%^⑮
予備群:11.01%^⑥

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:21.54%^{③⑦}
女性:16.36%^{③⑥}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.00%^{②⑤}
女性:4.46%^⑮

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.83%^{③⑤}
女性:5.46%^{③⑦}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:50.69%^⑮
女性:40.27%^⑮
大腸がん
男性:48.61%^⑮
女性:43.62%^⑨
肺がん
男性:56.94%^⑮
女性:49.66%^⑮

特定健診受診率
53.47%^⑮

特定保健指導実施率
22.67%^⑮

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:313.8g/日^⑦
女性:277.2g/日^⑮

食塩摂取量
男性:11.15g/日^{③⑥}
女性:9.59g/日^{④①}

<身体活動・運動>

歩数
男性:6,820^{④①}
女性:6,549^{②④}

スポーツ行動者率
男性:71.5%^{②⑨}
女性:56.1%^{④④}

<肥満>

BMI平均値
男性:24.2^{③⑧}
女性:22.5^⑮

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:28.4^{④④}
女性:9.4^{③⑤}
人口10万対気分障害受療率
134^{④⑥}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 150.7^{③③}

高齢者就業率
男性:58.74%^③
女性:39.93%^③

独居高齢者率
男性:10.05%^⑮
女性:17.17%^⑮

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:28.5%^⑮

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.8^{②④}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.50^⑮

岡山県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.77^{③⑧}
女性:74.13^{③⑩}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:479.8^{①⑨}
女性:238.4^③

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:156.7^⑧ 女性:75.2^①

年齢調整済み要介護認定率
13.5%^{③⑨}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:33.6^{④④}
女性:11.1^{②⑦}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:35.8^{①⑥}
女性:21.0^{②④}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.5^{②②}
女性:1.2^{③①}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:7.2^{①⑦}
女性:4.2^{②④}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:5.8^{②③}
女性:2.0^{①①}

新規透析導入患者数(人口100万対)
338.8^{③④}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:15.27%^{②⑦}
予備群:11.90%^{②⑥}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:20.62%^{②⑥}
女性:16.27%^{③④}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.29%^{③⑥}
女性:5.28%^{④④}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.63%^{①②}
女性:4.34%^{①②}

特定健診受診率
46.07%^{③⑨}

特定保健指導実施率
20.33%^{②⑧}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:49.18%^{①⑦}
女性:40.45%^{①②}
大腸がん
男性:45.08%^{②②}
女性:41.44%^{①⑧}
肺がん
男性:54.92%^{②⑩}
女性:51.61%^{②⑨}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:278.9g/日^{③②}
女性:253.3g/日^{③⑥}

食塩摂取量
男性:10.09g/日^④
女性:8.45g/日^④

<身体活動・運動>

歩数
男性:8,136^⑦
女性:6,042^{④②}

スポーツ行動者率
男性:71.4%^{③⑩}
女性:62.5%^{①⑨}

<肥満>

BMI平均値
男性:24.2^{③⑨}
女性:23.3^{④③}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:23.3^{①⑨}
女性:7.8^{①①}
人口10万対気分障害受療率
81^{①⑤}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 151^{③⑥}

高齢者就業率
男性:51.06%^{②⑧}
女性:32.77%^{③⑩}

独居高齢者率
男性:11.01%^{①⑨}
女性:19.63%^{②⑦}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:27.9%^{①③}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.6^⑧
一人平均むし歯数(3歳児)
0.54^{②③}

広島県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.04^{②⑥}
女性:72.98^{④⑦}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:471.2^⑩
女性:247.3^⑰

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:158.0^⑨ 女性:82.1^⑫

年齢調整済み要介護認定率
12.6%^⑫

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:35.2^{③⑧}
女性:14.1^{④⑩}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:33.7^⑦
女性:19.0^⑩

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.1^⑩
女性:1.2^{③①}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.3^{③⑦}
女性:4.0^{①⑨}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:5.1^{①⑦}
女性:3.0^{④②}

新規透析導入患者数(人口100万対)
327.0^{③①}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.87%^{②①}
予備群:11.95%^{②⑨}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:18.39%^⑩
女性:13.67%^⑥

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.34%^{③⑨}
女性:5.17%^{④①}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.88%^{①⑨}
女性:4.42%^{①④}

特定健診受診率
46.81%^{③⑤}

特定保健指導実施率
21.94%^{②④}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:45.23%^{③①}
女性:35.81%^{③②}
大腸がん
男性:41.62%^{③⑦}
女性:36.47%^{③②}
肺がん
男性:46.85%^{③⑨}
女性:37.79%^{③⑨}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:276.7g/日^{③④}
女性:269.9g/日^{②⑤}

食塩摂取量
男性:11.24g/日^{③⑧}
女性:8.98g/日^{①④}

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,829^{①③}
女性:7,357^③

スポーツ行動者率
男性:72.7%^{②⑩}
女性:60.7%^{③①}

<肥満>

BMI平均値
男性:23.7^⑩
女性:22.4^{①⑤}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:21.6^{①③}
女性:7.8^{①①}
人口10万対気分障害受療率
104^{③②}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 148.9^{②④}

高齢者就業率
男性:50.89%^{③①}
女性:32.62%^{③①}

独居高齢者率
男性:12.68%^{③③}
女性:23.03%^{③⑤}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:31.7%^{③②}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.6^⑧
一人平均むし歯数(3歳児)
0.42^⑨

山口県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.25^{②④}
女性:74.71^{①⑥}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:500.1^{③③}
女性:264.1^{③⑧}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:167.0^{③①} 女性:91.7^{④②}

年齢調整済み要介護認定率
12.7%^{①⑤}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:16.9^④
女性:7.3^⑧

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:37.9^{②⑤}
女性:21.2^{②⑥}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.8^{②⑥}
女性:1.3^{④①}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.8^{④①}
女性:4.3^{②⑨}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.6^{③⑥}
女性:2.0^{①①}

新規透析導入患者数(人口100万対)
315.3^{②⑦}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.27%^{①③}
予備群:11.51%^{①②}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:21.01%^{③④}
女性:16.66%^{③⑧}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.47%^{④③}
女性:5.43%^{④⑤}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.60%^{①⑩}
女性:5.07%^{③②}

特定健診受診率
42.81%^{④⑤}

特定保健指導実施率
18.01%^{③④}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:43.48%^{③⑨}
女性:29.90%^{④④}
大腸がん
男性:39.13%^{④②}
女性:29.21%^{④⑦}
肺がん
男性:50.00%^{③①}
女性:37.46%^{④①}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:270.0g/日^{④①}
女性:247.5g/日^{④①}

食塩摂取量
男性:10.70g/日^{②②}
女性:8.66g/日^⑥

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,817^{①④}
女性:6,969^{①①}

スポーツ行動者率
男性:71.9%^{②⑥}
女性:60.3%^{③②}

<肥満>

BMI平均値
男性:23.9^{②①}
女性:22.1^⑦

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:25.2^{③②}
女性:9.3^{③③}
人口10万対気分障害受療率
126^{④①}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 146.9^{①⑥}

高齢者就業率
男性:50.69%^{③④}
女性:33.89%^{②②}

独居高齢者率
男性:12.63%^{③②}
女性:24.21%^{④①}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:29.5%^{②③}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.8^{②④}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.64^{③③}

徳島県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.36^④
女性:73.4^④

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:510.5^⑦
女性:258.9^③

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:160.1^① 女性:78.1^③

年齢調整済み要介護認定率
13.2%^②

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:18.8^⑦
女性:7.4^⑩

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:40.3^③
女性:20.1^⑨

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:10.7^④
女性:1.0^②

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.2^③
女性:5.2^④

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.1^③
女性:2.8^③

新規透析導入患者数(人口100万対)
390.3^④

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:15.68%^②
予備群:12.12%^③

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:20.80%^③
女性:16.91%^④

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.62%^⑦
女性:4.83%^③

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.28%^②
女性:4.75%^②

特定健診受診率
46.34%^③

特定保健指導実施率
30.64%^②

<がん検診受診率>

胃がん
男性:37.50%^④
女性:32.50%^④
大腸がん
男性:35.53%^④
女性:32.50%^④
肺がん
男性:42.76%^④
女性:38.13%^③

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:312.6g/日^⑧
女性:309.0g/日^③

食塩摂取量
男性:10.19g/日^⑥
女性:9.06g/日^②

<身体活動・運動>

歩数
男性:6,791^④
女性:6,313^③

スポーツ行動者率
男性:70.3%^③
女性:61.0%^②

<肥満>
BMI平均値
男性:24.0^③
女性:22.1^⑤

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:23.2^⑧
女性:8.4^②
人口10万対気分障害受療率
44^①

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 151.2^③

高齢者就業率
男性:45.96%^④
女性:32.11%^③

独居高齢者率
男性:12.61%^③
女性:20.30%^②

<たばこ>
習慣的喫煙者
男性:26.3%^⑤

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
1.0^③
一人平均むし歯数(3歳児)
0.61^②

香川県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.98^{③①}
女性:73.74^{④①}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:478.8^⑱
女性:249.8^⑲

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:159.6^⑮ 女性:79.1^④

年齢調整済み要介護認定率
13.2%^⑳

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:21^⑨
女性:8.9^⑮

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:37.6^㉓
女性:18.1^⑦

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.0^{③①}
女性:0.8^⑪

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.0^㉔
女性:4.5^㉔

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:7.1^{④③}
女性:3.4^{④⑤}

新規透析導入患者数(人口100万対)
370.2^㉔

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:15.88%^㉔
予備群:11.36%^⑧

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:19.64%^㉔
女性:16.50%^㉔

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.98%^㉔
女性:4.70%^㉔

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.17%^㉔
女性:4.56%^⑮

特定健診受診率
49.61%^㉔

特定保健指導実施率
27.97%^⑦

<がん検診受診率>

胃がん
男性:51.02%^⑩
女性:40.85%^⑪
大腸がん
男性:49.49%^⑧
女性:43.19%^⑩
肺がん
男性:60.20%^⑥
女性:50.70%^⑩

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:284.9g/日^㉔
女性:260.9g/日^㉔

食塩摂取量
男性:10.57g/日^⑮
女性:8.57g/日^⑤

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,696^⑮
女性:6,260^{④④}

スポーツ行動者率
男性:71.2%^㉔
女性:61.0%^㉔

<肥満>

BMI平均値
男性:24.1^{④④}
女性:22.8^㉔

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:21.3^⑪
女性:8.7^㉔
人口10万対気分障害受療率
99^㉔

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 148.7^㉔

高齢者就業率
男性:49.74%^㉔
女性:34.12%^㉔

独居高齢者率
男性:12.15%^㉔
女性:20.38%^{③①}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:26.5%^⑥

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.9^㉔
一人平均むし歯数(3歳児)
0.61^㉔

愛媛県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.58⁽⁴³⁾
女性:74.1⁽³¹⁾

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:516.8⁽⁴¹⁾
女性:254.2⁽²⁵⁾

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:169.0⁽³⁴⁾ 女性:80.8⁽⁷⁾

年齢調整済み要介護認定率
13.3%⁽³⁴⁾

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:21.9⁽¹⁰⁾
女性:7.3⁽⁸⁾

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:38.6⁽²⁹⁾
女性:20.0⁽¹⁸⁾

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.9⁽²⁷⁾
女性:0.8⁽¹¹⁾

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.6⁽⁴⁰⁾
女性:4.3⁽²⁹⁾

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.1⁽³⁰⁾
女性:1.8⁽²⁾

新規透析導入患者数(人口100万対)
398.8⁽⁴⁵⁾

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:15.23%⁽²⁶⁾
予備群:11.69%⁽²¹⁾

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:23.08%⁽⁴⁴⁾
女性:17.94%⁽⁴⁴⁾

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.81%⁽¹³⁾
女性:4.90%⁽³⁶⁾

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.70%⁽¹⁴⁾
女性:4.09%⁽⁷⁾

<がん検診受診率>

胃がん
男性:42.96%⁽⁴¹⁾
女性:32.55%⁽³⁹⁾
大腸がん
男性:42.96%⁽³¹⁾
女性:36.24%⁽³⁵⁾
肺がん
男性:51.41%⁽²⁸⁾
女性:39.60%⁽³³⁾

特定健診受診率
42.98%⁽⁴⁴⁾

特定保健指導実施率
24.14%⁽¹⁵⁾

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:273.2g/日⁽³⁸⁾
女性:262.1g/日⁽³⁰⁾

食塩摂取量
男性:10.66g/日⁽²⁰⁾
女性:9.13g/日⁽²⁵⁾

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,845⁽¹²⁾
女性:6,945⁽¹³⁾

スポーツ行動者率
男性:72.2%⁽²³⁾
女性:61.9%⁽²⁵⁾

<肥満>
BMI平均値
男性:24.1⁽³⁷⁾
女性:23.1⁽⁴⁰⁾

<こころの健康>
人口10万対自殺死亡率
男性:24.9⁽³¹⁾
女性:9.4⁽³⁵⁾
人口10万対気分障害受療率
112⁽³⁵⁾

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 151.1⁽³⁷⁾

高齢者就業率
男性:49.39%⁽⁴⁰⁾
女性:33.35%⁽²⁶⁾

独居高齢者率
男性:12.85%⁽³⁵⁾
女性:24.25%⁽⁴¹⁾

<たばこ>
習慣的喫煙者
男性:29.9%⁽²⁶⁾

<歯の健康>
一人平均むし歯数(12歳児)
0.7⁽¹⁵⁾
一人平均むし歯数(3歳児)
0.62⁽³²⁾

高知県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.16^④
女性:74.2^②

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:506.3^③
女性:244.7^⑪

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:172.7^⑦ 女性:83.8^⑩

年齢調整済み要介護認定率
12.7%^⑮

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:36.1^④
女性:11.7^③

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:37.6^②
女性:20.2^②

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.9^⑦
女性:0.7^⑥

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.8^④
女性:4.4^③

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.1^③
女性:2.1^④

新規透析導入患者数(人口100万対)
465.0^④

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:16.53%^④
予備群:12.22%^③

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:21.79%^③
女性:16.26%^③

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.28%^③
女性:4.14%^⑥

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.51%^③
女性:5.03%^③

特定健診受診率
48.18%^③

特定保健指導実施率
17.97%^③

<がん検診受診率>

胃がん
男性:47.92%^②
女性:42.58%^⑦
大腸がん
男性:43.06%^②
女性:40.65%^⑨
肺がん
男性:54.17%^②
女性:52.26%^⑦

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:310.4g/日^⑩
女性:296.2g/日^⑦

食塩摂取量
男性:9.81g/日^②
女性:8.39g/日^③

<身体活動・運動>

歩数
男性:5,647^④
女性:5,840^④

スポーツ行動者率
男性:67.3%^④
女性:58.6%^④

<肥満>

BMI平均値
男性:25.1^④
女性:22.8^③

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:21.2^⑧
女性:6.4^③
人口10万対気分障害受療率
95^⑦

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 148.2^②

高齢者就業率
男性:47.63%^④
女性:37.42%^⑧

独居高齢者率
男性:16.03%^④
女性:26.43%^④

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:28.9%^⑨

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
1.0^②
一人平均むし歯数(3歳児)
0.47^⑮

福岡県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.67^④
女性:73.84^③

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:486.6^②
女性:254.0^②

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:175.0^④ 女性:93.7^④

年齢調整済み要介護認定率
13.1%^⑤

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:18.4^⑥
女性:7.2^⑥

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:33.6^⑥
女性:17.7^④

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:6.6^⑤
女性:1.2^③

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.6^⑩
女性:3.9^⑩

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.7^④
女性:2.5^④

新規透析導入患者数(人口100万対)
314.1^⑥

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:15.01%^②
予備群:12.05%^③

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:19.86%^②
女性:14.62%^⑦

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.62%^④
女性:5.27%^④

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.91%^③
女性:4.82%^③

<がん検診受診率>

胃がん
男性:43.89%^③
女性:33.39%^③
大腸がん
男性:40.98%^④
女性:32.53%^④
肺がん
男性:46.09%^④
女性:36.48%^④

特定健診受診率
47.23%^③

特定保健指導実施率
19.28%^③

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:320.2g/日^④
女性:276.2g/日^⑨

食塩摂取量
男性:11.72g/日^④
女性:9.51g/日^④

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,474^②
女性:7,155^⑧

スポーツ行動者率
男性:70.0%^③
女性:62.0%^③

<肥満>
BMI平均値
男性:24.0^⑦
女性:21.8^①

<こころの健康>
人口10万対自殺死亡率
男性:23.0^⑩
女性:8.3^⑩
人口10万対気分障害受療率
216^④

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 149.2^⑥

高齢者就業率
男性:48.45%^④
女性:30.43%^③

独居高齢者率
男性:13.97%^④
女性:24.15%^③

<たばこ>
習慣的喫煙者
男性:26.6%^⑦

<歯の健康>
一人平均むし歯数(12歳児)
1.0^③
一人平均むし歯数(3歳児)
0.53^②

佐賀県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.03^{②⑨}
女性:74.3^{②⑦}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:491.9^{②⑥}
女性:257.8^{③⑩}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:172.9^{③⑨} 女性:87.5^{③②}

年齢調整済み要介護認定率
11.7%^③

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:14.8^①
女性:5.5^①

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:38.4^{②⑦}
女性:20.7^{②①}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.7^{④②}
女性:1.3^{④④}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.1^{③②}
女性:4.3^{②⑨}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.6^{③⑤}
女性:2.5^{②④}

新規透析導入患者数(人口100万対)
296.1^{①⑨}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.84%^{②⑦}
予備群:12.70%^{④⑥}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:17.97%^⑤
女性:13.49%^⑤

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.11%^{②⑧}
女性:4.80%^{③⑩}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:10.34%^{④③}
女性:6.05%^{④⑤}

特定健診受診率
48.68%^{②⑦}

特定保健指導実施率
30.38%^③

<がん検診受診率>

胃がん
男性:46.01%^{②⑧}
女性:39.11%^{①⑧}
大腸がん
男性:41.10%^{③⑨}
女性:35.75%^{③⑦}
肺がん
男性:49.69%^{③②}
女性:46.37%^{②③}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:289.2g/日^{①⑨}
女性:252.3g/日^{③⑨}

食塩摂取量
男性:10.58g/日^{①⑥}
女性:8.75g/日^⑨

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,283^{②⑦}
女性:6,635^{②①}

スポーツ行動者率
男性:68.0%^{④①}
女性:59.3%^{③⑧}

<肥満>

BMI平均値
男性:23.7^{①⑦}
女性:22.8^{③③}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:22.0^{①④}
女性:6.1^②
人口10万対気分障害受療率
131^{④⑤}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 153.7^{④⑤}

高齢者就業率
男性:54.79%^{①⑧}
女性:37.90%^⑥

独居高齢者率
男性:9.36%^⑥
女性:16.67%^{①③}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:33.2%^{③⑥}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.7^{①⑤}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.78^{④④}

長崎県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.67^{④①}
女性:73.79^{③⑧}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:496.7^{②⑨}
女性:256.4^{②⑧}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:172.8^{③⑧} 女性:91.0^{④①}

年齢調整済み要介護認定率
13.1%^{②⑤}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:28.2^{②⑤}
女性:10.8^{②⑥}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:34.0^{②⑨}
女性:19.3^{①④}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.5^{③⑧}
女性:1.2^{③①}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:7.9^{②⑦}
女性:4.2^{②④}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:4.5^{②⑧}
女性:1.8^{②②}

新規透析導入患者数(人口100万対)
336.0^{③③}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:15.75%^{③③}
予備群:12.08%^{③②}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:23.50%^{④⑤}
女性:18.28%^{④⑥}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.72%^{①⑩}
女性:4.46%^{①⑦}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.62%^{①①}
女性:4.76%^{②①}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:40.29%^{④⑤}
女性:32.15%^{④①}
大腸がん
男性:37.77%^{④④}
女性:31.19%^{④⑥}
肺がん
男性:43.88%^{④⑤}
女性:37.30%^{④①}

特定健診受診率
44.59%^{④②}

特定保健指導実施率
27.71%^{②⑧}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:269.1g/日^{④③}
女性:248.6g/日^{④④}

食塩摂取量
男性:10.52g/日^{①③}
女性:8.71g/日^{②⑧}

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,061^{③⑤}
女性:6,929^{①④}

スポーツ行動者率
男性:70.6%^{③③}
女性:59.1%^{③⑨}

<肥満>

BMI平均値
男性:23.6^{②⑨}
女性:22.9^{③⑥}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:23.0^{①⑥}
女性:7.1^{①⑦}
人口10万対気分障害受療率
114^{③⑦}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 152.1^{④②}

高齢者就業率
男性:50.61%^{③⑥}
女性:32.57%^{③②}

独居高齢者率
男性:12.01%^{②⑤}
女性:22.46%^{③④}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:35.3%^{④③}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
1.0^{③②}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.74^{④①}

熊本の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.68^⑩
女性:74.41^{②③}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:466.6^⑧
女性:240.7^④

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:154.5^⑦ 女性:81.0^⑧

年齢調整済み要介護認定率
13.2%^{②⑨}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:16.2^②
女性:6.3^③

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:33.9^⑧
女性:19.2^⑬

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.1^⑩
女性:0.9^⑱

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.4^⑨
女性:4.8^{④③}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:4.6^⑩
女性:1.9^⑦

新規透析導入患者数(人口100万対)
316.7^{②⑨}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:16.24%^{④⑩}
予備群:12.42%^{④⑩}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:20.90%^{③③}
女性:15.54%^{②⑤}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.71%^⑨
女性:4.24%^⑩

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:10.78%^{④⑥}
女性:5.50%^{③⑧}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:51.00%^⑪
女性:40.16%^⑭
大腸がん
男性:43.02%^{③⑩}
女性:38.56%^{②⑥}
肺がん
男性:49.57%^{③④}
女性:44.95%^{②⑥}

特定健診受診率
46.72%^{③⑥}

特定保健指導実施率
28.37%^⑥

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:286.5g/日^{②③}
女性:273.9g/日^{②①}

食塩摂取量
男性:10.70g/日^{②③}
女性:9.30g/日^{③⑩}

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,200^{③①}
女性:6,465^{②⑧}

スポーツ行動者率
男性:72.0%^{②④}
女性:62.0%^{②③}

<肥満>

BMI平均値
男性:24.0^{②⑧}
女性:22.9^{③⑤}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:27.4^{④⑩}
女性:7.8^{①①}
人口10万対気分障害受療率
113^{③⑥}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 146.9^{①⑥}

高齢者就業率
男性:50.98%^{②⑨}
女性:35.71%^{①⑤}

独居高齢者率
男性:11.00%^{①⑧}
女性:20.08%^{②⑧}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:38.5%^{④⑦}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
1.1^{④②}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.77^{④③}

大分県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.98^⑩
女性:74.53^⑫

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:464.9^⑦
女性:243.7^⑨

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:151.0^④ 女性:80.3^⑥

年齢調整済み要介護認定率
11.9%^④

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:31.3^⑪
女性:11.4^⑧

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:34.2^⑩
女性:18.8^⑧

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.4^⑬
女性:1.2^⑪

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:7.4^⑪
女性:4.4^⑬

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:5.7^⑫
女性:2.5^⑫

新規透析導入患者数(人口100万対)
381.1^⑫

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.91%^⑫
予備群:11.94%^⑫

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:20.87%^⑬
女性:15.69%^⑫

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.19%^⑬
女性:4.88%^⑬

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.68%^⑭
女性:5.63%^⑭

<がん検診受診率>

胃がん
男性:49.35%^⑮
女性:39.29%^⑮
大腸がん
男性:42.42%^⑮
女性:36.51%^⑮
肺がん
男性:54.11%^⑮
女性:46.03%^⑮

特定健診受診率
54.04%^⑫

特定保健指導実施率
24.24%^⑭

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:299.8g/日^⑮
女性:262.8g/日^⑮

食塩摂取量
男性:10.44g/日^⑮
女性:8.84g/日^⑮

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,599^⑮
女性:6,954^⑮

スポーツ行動者率
男性:72.8%^⑮
女性:62.1%^⑮

<肥満>

BMI平均値
男性:23.8^⑮
女性:22.5^⑮

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:20.2^⑮
女性:10.0^⑮
人口10万対気分障害受療率
123^⑮

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 149.5^⑮

高齢者就業率
男性:51.33%^⑮
女性:34.13%^⑮

独居高齢者率
男性:11.69%^⑮
女性:22.23%^⑮

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:25.3%^⑮

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
1.4^⑮
一人平均むし歯数(3歳児)
0.72^⑮

宮崎県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.62^⑬
女性:74.97^⑧

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:498.7^⑳
女性:257.7^㉑

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:165.1^㉒ 女性:86.1^㉓

年齢調整済み要介護認定率
11.6%^㉔

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:24.3^㉕
女性:9.1^㉖

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:42.2^㉗
女性:26.3^㉘

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.2^㉙
女性:1.6^㉚

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.0^㉛
女性:3.9^㉜

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:5.6^㉝
女性:2.5^㉞

新規透析導入患者数(人口100万対)
415.1^㉟

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:15.54%^㊲
予備群:12.56%^㊳

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:20.56%^㊴
女性:16.35%^㊵

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.51%^㊶
女性:4.20%^㊷

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.60%^㊸
女性:5.45%^㊹

<がん検診受診率>

胃がん
男性:44.91%^㊺
女性:35.86%^㊻
大腸がん
男性:42.59%^㊼
女性:35.44%^㊽
肺がん
男性:50.93%^㊾
女性:44.73%^㊿

特定健診受診率
44.78%^㊿

特定保健指導実施率
28.58%^㊿

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:291.7g/日^㊿
女性:277.8g/日^㊿

食塩摂取量
男性:10.72g/日^㊿
女性:9.45g/日^㊿

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,022^㊿
女性:5,939^㊿

スポーツ行動者率
男性:69.8%^㊿
女性:59.8%^㊿

<肥満>

BMI平均値
男性:24.8^㊿
女性:23.8^㊿

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:27.5^㊿
女性:8.0^㊿
人口10万対気分障害受療率
93^㊿

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 150.9^㊿

高齢者就業率
男性:50.81%^㊿
女性:36.77%^㊿

独居高齢者率
男性:12.79%^㊿
女性:24.07%^㊿

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:28.1%^㊿

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
1.0^㊿
一人平均むし歯数(3歳児)
0.77^㊿

鹿児島県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.68^⑩
女性:74.85^⑬

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:512.4^{③⑨}
女性:264.7^{③⑨}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:161.4^{②①} 女性:85.6^{②③}

年齢調整済み要介護認定率
12.6%^⑫

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:26.5^{②①}
女性:11.8^{③⑥}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:44.1^{③⑨}
女性:27.5^{④④}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.3^{③④}
女性:1.3^{④①}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.0^{②⑧}
女性:4.7^{③⑨}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:7.2^{④⑤}
女性:2.9^{③⑦}

新規透析導入患者数(人口100万対)
393.0^{④④}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:16.31%^{④①}
予備群:12.47%^{④①}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:22.14%^{④②}
女性:16.76%^{③⑨}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.88%^{①⑥}
女性:4.72%^{②⑥}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:10.21%^{④①}
女性:5.73%^{④③}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:47.48%^{②③}
女性:36.75%^{②⑥}
大腸がん
男性:44.51%^{②⑤}
女性:38.46%^{②⑧}
肺がん
男性:56.68%^{①④}
女性:52.14%^{②⑧}

特定健診受診率
48.19%^{②⑨}

特定保健指導実施率
25.09%^{①⑩}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:279.4g/日^{③①}
女性:254.3g/日^{③⑥}

食塩摂取量
男性:11.32g/日^{④①}
女性:9.34g/日^{③③}

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,296^{②⑥}
女性:6,700^{②①}

スポーツ行動者率
男性:73.5%^{①②}
女性:63.5%^{①⑥}

<肥満>

BMI平均値
男性:24.5^{④②}
女性:22.8^{②⑧}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:23.5^{②③}
女性:7.7^{①①}
人口10万対気分障害受療率
95^{②⑦}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 149.8^{③①}

高齢者就業率
男性:50.62%^{③⑤}
女性:34.71%^{①⑥}

独居高齢者率
男性:15.18%^{④③}
女性:28.70%^{④⑦}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:28.6%^{①⑦}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
1.0^{③②}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.64^{③④}

沖縄県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.64^⑫
女性:74.89^⑪

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:498.4^{③①}
女性:251.7^{②①}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:153.0^⑥ 女性:86.2^{②⑥}

年齢調整済み要介護認定率
13.7%^{④③}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:35.4^{④⑨}
女性:11.5^{③①}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:38.1^{②⑥}
女性:17.5^③

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:9.3^{④⑤}
女性:1.6^{④⑦}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.8^⑬
女性:4.2^{②④}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.7^{④①}
女性:3.9^{④⑦}

新規透析導入患者数(人口100万対)
308.4^{②②}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:18.08%^{④⑦}
予備群:14.78%^{④⑦}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:18.61%^⑬
女性:14.38%^⑭

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.86%^⑭
女性:4.39%^⑬

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.68%^{③②}
女性:5.76%^{④④}

特定健診受診率
49.77%^{②④}

特定保健指導実施率
32.49%^①

<がん検診受診率>

胃がん
男性:43.94%^{③⑤}
女性:39.19%^{①⑦}
大腸がん
男性:36.68%^{④⑥}
女性:34.80%^{③⑨}
肺がん
男性:45.33%^{④③}
女性:41.55%^{②⑨}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:272.5g/日^{④④}
女性:268.0g/日^{②⑥}

食塩摂取量
男性:9.13g/日^①
女性:7.98g/日^①

<身体活動・運動>

歩数
男性:6,850^{③⑨}
女性:6,052^{④④}

スポーツ行動者率
男性:74.0%^{①①}
女性:62.1%^{②②}

<肥満>

BMI平均値
男性:24.1^{③⑤}
女性:23.8^{④⑤}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:28.6^{④⑤}
女性:8.5^{②②}
人口10万対気分障害受療率
91^{②③}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 149.3^{②⑦}

高齢者就業率
男性:42.42%^{④⑦}
女性:28.30%^{④③}

独居高齢者率
男性:16.15%^{④⑤}
女性:20.50%^{③①}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:27.2%^⑨

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
1.8^{④⑦}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.87^{④⑥}