

愛知県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:72.15^③
女性:75.3^③

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:467.9^⑨
女性:260.2^{③④}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:159.4^⑫ 女性:89.4^{③⑥}

年齢調整済み要介護認定率
12.2%^⑦

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:26.3^{②②}
女性:11.6^{③②}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:34.2^{①②}
女性:20.7^{②①}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:6.2^②
女性:0.9^{①⑨}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:7.3^{①⑧}
女性:3.8^{①②}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:4.3^⑥
女性:2.2^{①⑦}

新規透析導入患者数(人口100万対)
259.7^⑥

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.54%^{①⑤}
予備群:11.42%^{①⑩}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:18.75%^{①⑥}
女性:15.56%^{②⑥}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.07%^{②⑥}
女性:4.80%^{②⑨}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.68%^{①③}
女性:4.83%^{②⑥}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:44.22%^{③④}
女性:36.60%^{②⑦}
大腸がん
男性:42.88%^{③②}
女性:40.23%^{②②}
肺がん
男性:49.66%^{③③}
女性:40.77%^{③⑩}

特定健診受診率
53.09%^{①④}

特定保健指導実施率
20.28%^{②⑨}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:228.8g/日^{④⑦}
女性:237.7g/日^{④⑤}

食塩摂取量
男性:10.58g/日^{①⑦}
女性:9.32g/日^{③②}

<身体活動・運動>

歩数
男性:8,035^{①⑩}
女性:6,077^{③⑦}

スポーツ行動者率
男性:75.4%^⑥
女性:66.9%^⑤

<肥満>

BMI平均値
男性:23.3^④
女性:22.9^{③④}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:20.2^②
女性:7.8^{①①}
人口10万対気分障害受療率
90^{②⑩}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 144.6^{①①}

高齢者就業率
男性:51.96%^{②①}
女性:33.88%^{②③}

独居高齢者率
男性:12.32%^{②⑧}
女性:18.89%^{②③}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:27.5%^{①②}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.5^④
一人平均むし歯数(3歳児)
0.32^③

三重県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.4^⑱
女性:75.02^⑦

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:488.3^{②④}
女性:258.1^{③①}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:160.7^{①⑨} 女性:81.1^⑨

年齢調整済み要介護認定率
13.3%^{③④}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:31.8^{③②}
女性:12.4^{③⑦}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:37.1^{②②}
女性:23.1^{③④}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.4^{③⑥}
女性:1.0^{②③}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.2^{③⑤}
女性:4.2^{②④}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.5^{③⑤}
女性:2.9^{③⑦}

新規透析導入患者数(人口100万対)
310.0^{②④}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.78%^{①⑦}
予備群:11.57%^{①⑥}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:18.37%^⑨
女性:15.91%^{③⑩}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.00%^{②③}
女性:4.88%^{③④}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.06%^{②②}
女性:4.80%^{②②}

特定健診受診率
54.24%^{①⑩}

特定保健指導実施率
19.05%^{③②}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:45.07%^{③②}
女性:36.13%^{②⑧}
大腸がん
男性:44.51%^{②⑥}
女性:40.58%^{②⑨}
肺がん
男性:49.86%^{③①}
女性:41.88%^{②⑧}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:268.7g/日^{④④}
女性:239.8g/日^{④④}

食塩摂取量
男性:10.68g/日^{②①}
女性:9.00g/日^{①⑦}

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,119^{③③}
女性:6,460^{③⑩}

スポーツ行動者率
男性:72.3%^{②②}
女性:61.7%^{②⑦}

<肥満>

BMI平均値
男性:23.5^⑧
女性:22.3^{①②}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:24.6^{②⑧}
女性:8.8^{②⑦}
人口10万対気分障害受療率
96^{②⑨}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 145.7^{①②}

高齢者就業率
男性:52.01%^{②⑩}
女性:34.12%^{②⑩}

独居高齢者率
男性:10.72%^{①⑥}
女性:19.15%^{②⑤}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:35.1%^{④⑩}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
1.0^{③②}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.54^{②②}

滋賀県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.31^{②②}
女性:73.4^{④④}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:437.9^②
女性:240.8^⑤

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:149.1^② 女性:82.9^{④④}

年齢調整済み要介護認定率
13.1%^{②⑤}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:30.4^⑦
女性:11.7^{③③}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:26.4^①
女性:17.1^②

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.5^{③⑧}
女性:1.0^{②③}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.7^{①①}
女性:3.8^{④②}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:4.4^⑦
女性:2.0^{①①}

新規透析導入患者数(人口100万対)
292.3^{④⑧}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:13.90%^⑦
予備群:11.58%^{④⑧}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:18.01%^⑥
女性:14.90%^{②⑩}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.38%^{④①}
女性:4.89%^{③⑤}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:7.70%^②
女性:3.71%^②

特定健診受診率
51.00%^{②①}

特定保健指導実施率
22.83%^{④⑨}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:49.64%^{④④}
女性:34.83%^{③③}
大腸がん
男性:47.46%^{④②}
女性:39.66%^{②④}
肺がん
男性:52.54%^{②⑥}
女性:39.31%^{③④}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:269.3g/日^{④②}
女性:240.2g/日^{④③}

食塩摂取量
男性:10.10g/日^⑤
女性:8.70g/日^⑦

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,760^{④⑥}
女性:7,292^④

スポーツ行動者率
男性:76.9%^②
女性:66.5%^⑥

<肥満>

BMI平均値
男性:23.9^{②④}
女性:22.1^④

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:22.2^{④⑤}
女性:9.1^{③④}
人口10万対気分障害受療率
78^{④②}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 143^⑨

高齢者就業率
男性:51.49%^{②④}
女性:31.00%^{③⑦}

独居高齢者率
男性:9.67%^⑧
女性:15.88%^{④⑩}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:20.6%^①

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.6^⑧
一人平均むし歯数(3歳児)
0.46^{④④}

京都府の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.82^{③⑥}
女性:73.53^{④③}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:455.1^⑤
女性:245.4^⑫

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:159.5^⑭ 女性:85.1^⑳

年齢調整済み要介護認定率
14.5%^{④⑥}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:39.3^{④①}
女性:15.9^{④①}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:33.1^④
女性:18.8^⑧

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.4^{①⑨}
女性:1.3^{④①}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:7.3^{①⑧}
女性:3.9^{①⑥}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:4.0^⑤
女性:2.3^{①⑨}

新規透析導入患者数(人口100万対)
258.6^⑤

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:13.71%^④
予備群:11.55%^⑮

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:17.84%^④
女性:13.86%^⑧

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.28%^{③④}
女性:4.71%^{②⑤}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.53%^⑨
女性:4.17%^{①①}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:41.54%^{④④}
女性:29.68%^{④⑤}
大腸がん
男性:40.38%^{④①}
女性:33.75%^{④①}
肺がん
男性:46.15%^{④①}
女性:36.75%^{④②}

特定健診受診率
48.37%^{②⑧}

特定保健指導実施率
16.32%^{④①}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:287.9g/日^{②②}
女性:253.8g/日^{③⑦}

食塩摂取量
男性:10.75g/日^{②⑧}
女性:8.98g/日^{①⑤}

<身体活動・運動>

歩数
男性:8,572^⑤
女性:7,524^②

スポーツ行動者率
男性:74.0%^{①①}
女性:66.4%^⑦

<肥満>
BMI平均値
男性:23.4^⑤
女性:22.0^②

<こころの健康>
人口10万対自殺死亡率
男性:21.2^⑧
女性:8.8^⑦
人口10万対気分障害受療率
90^{②①}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 138.2^④

高齢者就業率
男性:53.89%^{①④}
女性:32.56%^{③③}

独居高齢者率
男性:13.80%^{④①}
女性:23.64%^{③⑥}

<たばこ>
習慣的喫煙者
男性:30.6%^{②⑧}

<歯の健康>
一人平均むし歯数(12歳児)
0.6^⑧
一人平均むし歯数(3歳児)
0.45^⑫

大阪府の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.45^{④④}
女性:73.17^{④⑥}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:516.3^{④①}
女性:263.7^{③⑦}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:181.3^{④③} 女性:93.0^{④③}

年齢調整済み要介護認定率
15.1%^{④⑦}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:44.3^{④⑥}
女性:17.4^{④③}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:33.2^⑤
女性:16.6^①

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.5^{③⑧}
女性:1.2^{③①}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.1^{③②}
女性:5.0^{④④}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.0^{②⑦}
女性:2.8^{③⑤}

新規透析導入患者数(人口100万対)
311.9^{②⑤}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.09%^⑨
予備群:12.35%^{③⑧}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:18.34%^⑧
女性:13.89%^⑨

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.45%^{④②}
女性:5.07%^{③⑨}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.72%^{①⑤}
女性:4.13%^{①⑩}

特定健診受診率
46.96%^{③④}

特定保健指導実施率
15.36%^{④③}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:39.02%^{④⑥}
女性:28.91%^{④⑥}
大腸がん
男性:36.73%^{④⑤}
女性:32.28%^{④④}
肺がん
男性:41.20%^{④⑦}
女性:31.96%^{④⑦}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:253.5g/日^{④⑥}
女性:226.8g/日^{④⑦}

食塩摂取量
男性:9.90g/日^③
女性:8.36g/日^②

<身体活動・運動>

歩数
男性:8,762^①
女性:7,186^⑦

スポーツ行動者率
男性:72.0%^{②④}
女性:62.2%^{②⑩}

<肥満>

BMI平均値
男性:24.0^{③①}
女性:22.7^{②⑤}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:23.3^{①⑨}
女性:9.2^{③①}
人口10万対気分障害受療率
70^⑨

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 141.8^⑦

高齢者就業率
男性:47.02%^{④⑤}
女性:27.68%^{④⑤}

独居高齢者率
男性:17.92%^{④⑥}
女性:26.62%^{④⑤}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:29.3%^{②②}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.7^{①⑤}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.54^{②④}

兵庫県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.88^{③④}
女性:73.56^{④②}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:477.8^{①⑦}
女性:255.5^{②⑥}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:167.3^{③②} 女性:88.7^{③④}

年齢調整済み要介護認定率
12.7%^⑮

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:30.7^{②⑨}
女性:11.7^{③③}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:36.9^{②①}
女性:19.1^{①②}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.9^{②⑦}
女性:1.3^{④①}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.9^{①⑥}
女性:4.3^{②⑨}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.0^{②⑦}
女性:2.6^{③②}

新規透析導入患者数(人口100万対)
276.8^⑨

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.47%^{①④}
予備群:11.81%^{②④}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:18.75%^{①⑤}
女性:14.01%^{①①}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.23%^{③③}
女性:5.26%^{④②}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.86%^{①⑦}
女性:4.37%^{①③}

特定健診受診率
47.87%^{③②}

特定保健指導実施率
16.13%^{④①}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:43.59%^{③⑧}
女性:28.80%^{④⑦}
大腸がん
男性:44.04%^{②⑧}
女性:35.81%^{③⑥}
肺がん
男性:47.50%^{③⑦}
女性:34.56%^{④④}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:293.9g/日^{①⑤}
女性:261.9g/日^{③①}

食塩摂取量
男性:10.48g/日^{①①}
女性:9.10g/日^{②③}

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,782^{①⑤}
女性:6,813^{①⑦}

スポーツ行動者率
男性:75.4%^⑥
女性:64.2%^{①①}

<肥満>

BMI平均値
男性:23.8^{①⑨}
女性:22.4^{①④}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:20.7^⑤
女性:9.9^{④②}
人口10万対気分障害受療率
78^⑫

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 136.7^②

高齢者就業率
男性:47.76%^{④②}
女性:27.24%^{④⑥}

独居高齢者率
男性:13.56%^{③⑦}
女性:23.71%^{③⑦}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:25.8%^④

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.6^⑧
一人平均むし歯数(3歳児)
0.42^⑩

奈良県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.94^{③②}
女性:73.85^{③⑥}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:452.9^③
女性:243.9^⑩

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:160.0^⑩ 女性:82.3^⑬

年齢調整済み要介護認定率
12.8%^{②⑩}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:19.9^⑧
女性:6.9^④

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:29.0^②
女性:17.8^⑤

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.4^⑨
女性:0.6^④

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:5.0^②
女性:3.7^⑩

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:3.6^①
女性:2.5^{②④}

新規透析導入患者数(人口100万対)
286.4^⑮

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.23%^⑫
予備群:12.33%^{③⑦}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:18.87%^⑮
女性:14.30%^⑬

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.30%^{③⑦}
女性:5.60%^{④⑥}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.77%^⑮
女性:3.98%^④

<がん検診受診率>

胃がん
男性:41.85%^{④③}
女性:31.17%^{④②}
大腸がん
男性:41.11%^{③⑧}
女性:36.69%^{③⑩}
肺がん
男性:45.19%^{④④}
女性:32.79%^{④⑤}

特定健診受診率
44.01%^{④③}

特定保健指導実施率
16.84%^{③⑦}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:279.1g/日^{③①}
女性:263.5g/日^{②⑦}

食塩摂取量
男性:10.56g/日^{④④}
女性:9.22g/日^{②⑦}

<身体活動・運動>

歩数
男性:8,631^③
女性:6,787^⑩

スポーツ行動者率
男性:74.7%^⑧
女性:64.9%^⑨

<肥満>

BMI平均値
男性:23.7^{④④}
女性:22.3^{④①}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:21.1^⑦
女性:7.6^⑨
人口10万対気分障害受療率
65^⑦

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 134.5^①

高齢者就業率
男性:47.61%^{④④}
女性:23.88%^{④⑦}

独居高齢者率
男性:9.95%^⑨
女性:19.33%^{②⑥}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:22.0%^②

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.7^⑮
一人平均むし歯数(3歳児)
0.58^{②⑥}

和歌山県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.07^{②⑤}
女性:74.05^{③③}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:520.7^{④④}
女性:268.9^{④③}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:176.2^{④②} 女性:86.7^{②⑧}

年齢調整済み要介護認定率
13.6%^{④①}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:43^{④③}
女性:18.2^{④⑤}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:32.4^③
女性:19.5^{①⑥}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:10.0^{④⑥}
女性:1.1^{②⑦}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.8^{④①}
女性:4.7^{③⑨}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:4.9^{①⑤}
女性:2.4^{②③}

新規透析導入患者数(人口100万対)
364.0^{③⑧}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:16.01%^{③⑦}
予備群:12.51%^{④③}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:24.03%^{④⑥}
女性:17.91%^{④③}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.67%^{④⑤}
女性:5.97%^{④⑦}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.86%^{③⑥}
女性:5.16%^{③③}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:43.15%^{④①}
女性:33.94%^{③⑤}
大腸がん
男性:39.09%^{④③}
女性:34.39%^{④①}
肺がん
男性:47.21%^{③⑧}
女性:40.27%^{③②}

特定健診受診率
41.39%^{④⑥}

特定保健指導実施率
22.77%^{②①}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:280.4g/日^{②⑦}
女性:232.4g/日^{④⑥}

食塩摂取量
男性:10.62g/日^{①⑧}
女性:8.83g/日^{①①}

<身体活動・運動>

歩数
男性:6,743^{④③}
女性:6,062^{③⑨}

スポーツ行動者率
男性:69.1%^{③⑨}
女性:58.7%^{④①}

<肥満>

BMI平均値
男性:23.9^{②①}
女性:22.5^{②①}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:26.2^{③④}
女性:6.7^④
人口10万対気分障害受療率
71^{①①}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 145.9^{①④}

高齢者就業率
男性:50.92%^{③①}
女性:33.32%^{②⑦}

独居高齢者率
男性:13.64%^{③⑨}
女性:24.29%^{④②}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:29.7%^{②④}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.9^{②⑦}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.72^{④①}

鳥取県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.87^{③⑤}
女性:73.95^{③④}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:518.9^{④②}
女性:246.4^{①④}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:185.8^{④⑥} 女性:87.1^{③⑩}

年齢調整済み要介護認定率
12.3%^⑧

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:31.1^{③⑩}
女性:12.7^{③⑧}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:45.0^{④①}
女性:22.9^{③②}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.2^{①⑤}
女性:0.3^①

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.8^{①③}
女性:4.3^{②⑨}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:9.3^{④⑥}
女性:2.1^{①④}

新規透析導入患者数(人口100万対)
258.4^④

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:13.81%^⑤
予備群:11.53%^{①④}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:22.71%^{④③}
女性:18.12%^{④⑤}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.28%^{③⑤}
女性:5.05%^{③⑧}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.27%^⑤
女性:4.01%^⑤

特定健診受診率
48.07%^{③①}

特定保健指導実施率
22.18%^{②③}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:48.67%^{②⑩}
女性:41.32%^{①⑩}
大腸がん
男性:46.90%^{①⑤}
女性:42.15%^{①③}
肺がん
男性:57.52%^⑧
女性:50.41%^{①②}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:288.8g/日^{②⑩}
女性:278.0g/日^{①④}

食塩摂取量
男性:10.33g/日^⑧
女性:8.90g/日^{①②}

<身体活動・運動>

歩数
男性:6,698^{④④}
女性:5,857^{④⑥}

スポーツ行動者率
男性:71.3%^{③①}
女性:59.6%^{③⑥}

<肥満>
BMI平均値
男性:23.7^{①①}
女性:22.1^⑥

<こころの健康>
人口10万対自殺死亡率
男性:24.1^{②⑤}
女性:6.8^⑥
人口10万対気分障害受療率
127^{④②}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 151.3^{④⑩}

高齢者就業率
男性:52.93%^{①⑦}
女性:37.16%^{①①}

独居高齢者率
男性:10.29%^{①④}
女性:17.00%^{①⑥}

<たばこ>
習慣的喫煙者
男性:32.7%^{③③}

<歯の健康>
一人平均むし歯数(12歳児)
0.7^{①⑤}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.34^⑤

島根県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.04^{②⑥}
女性:74.73^⑮

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:492.6^{②⑦}
女性:236.9^②

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:172.6^{③⑥} 女性:79.7^⑤

年齢調整済み要介護認定率
13%^{②④}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:16.2^②
女性:6.9^④

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:38.5^{②⑤}
女性:21.3^{②⑦}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.5^{③⑧}
女性:0.9^{⑩⑨}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.8^⑬
女性:3.3^⑤

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:4.8^⑬
女性:1.7^①

新規透析導入患者数(人口100万対)
256.9^②

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.75%^⑮
予備群:11.01%^⑥

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:21.54%^{③⑦}
女性:16.36%^{③⑥}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.00%^{②⑤}
女性:4.46%^⑮

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.83%^{③⑤}
女性:5.46%^{③⑦}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:50.69%^⑬
女性:40.27%^⑬
大腸がん
男性:48.61%^⑩
女性:43.62%^⑨
肺がん
男性:56.94%^⑬
女性:49.66%^⑭

特定健診受診率
53.47%^⑬

特定保健指導実施率
22.67%^{②①}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:313.8g/日^⑦
女性:277.2g/日^{⑩⑦}

食塩摂取量
男性:11.15g/日^{③⑥}
女性:9.59g/日^{④①}

<身体活動・運動>

歩数
男性:6,820^{④⑩}
女性:6,549^{②④}

スポーツ行動者率
男性:71.5%^{②⑨}
女性:56.1%^{④④}

<肥満>

BMI平均値
男性:24.2^{③⑧}
女性:22.5^⑮

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:28.4^{④④}
女性:9.4^{③⑤}
人口10万対気分障害受療率
134^{④⑥}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 150.7^{③③}

高齢者就業率
男性:58.74%^③
女性:39.93%^③

独居高齢者率
男性:10.05%^⑩
女性:17.17%^{⑩⑦}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:28.5%^⑮

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.8^{②④}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.50^{⑩⑨}

岡山県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.77^{③⑧}
女性:74.13^{③⑩}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:479.8^{①⑨}
女性:238.4^③

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:156.7^⑧ 女性:75.2^①

年齢調整済み要介護認定率
13.5%^{③⑨}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:33.6^{④④}
女性:11.1^{②⑦}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:35.8^{①⑥}
女性:21.0^{②④}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.5^{②②}
女性:1.2^{③①}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:7.2^{①⑦}
女性:4.2^{②④}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:5.8^{②③}
女性:2.0^{①①}

新規透析導入患者数(人口100万対)
338.8^{③④}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:15.27%^{②⑦}
予備群:11.90%^{②⑥}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:20.62%^{②⑥}
女性:16.27%^{③④}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.29%^{③⑥}
女性:5.28%^{④④}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.63%^{①②}
女性:4.34%^{①②}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:49.18%^{①⑦}
女性:40.45%^{①②}
大腸がん
男性:45.08%^{②②}
女性:41.44%^{①⑧}
肺がん
男性:54.92%^{②⑩}
女性:51.61%^{②⑨}

特定健診受診率
46.07%^{③⑨}

特定保健指導実施率
20.33%^{②⑧}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:278.9g/日^{③②}
女性:253.3g/日^{③⑥}

食塩摂取量
男性:10.09g/日^④
女性:8.45g/日^④

<身体活動・運動>

歩数
男性:8,136^⑦
女性:6,042^{④②}

スポーツ行動者率
男性:71.4%^{③⑩}
女性:62.5%^{①⑨}

<肥満>

BMI平均値
男性:24.2^{③⑨}
女性:23.3^{④③}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:23.3^{①⑨}
女性:7.8^{①①}
人口10万対気分障害受療率
81^{①⑤}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 151^{③⑥}

高齢者就業率
男性:51.06%^{②⑧}
女性:32.77%^{③⑩}

独居高齢者率
男性:11.01%^{①⑨}
女性:19.63%^{②⑦}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:27.9%^{①③}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.6^⑧
一人平均むし歯数(3歳児)
0.54^{②③}

広島県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.04^{②⑥}
女性:72.98^{④⑦}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:471.2^⑩
女性:247.3^⑰

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:158.0^⑨ 女性:82.1^⑫

年齢調整済み要介護認定率
12.6%^⑫

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:35.2^{③⑧}
女性:14.1^{④⑩}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:33.7^⑦
女性:19.0^⑩

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.1^⑩
女性:1.2^{③①}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.3^{③⑦}
女性:4.0^{①⑨}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:5.1^{①⑦}
女性:3.0^{④②}

新規透析導入患者数(人口100万対)
327.0^{③①}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.87%^{②①}
予備群:11.95%^{②⑨}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:18.39%^⑩
女性:13.67%^⑥

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.34%^{③⑨}
女性:5.17%^{④①}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.88%^{①⑨}
女性:4.42%^{①④}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:45.23%^{③①}
女性:35.81%^{③②}
大腸がん
男性:41.62%^{③⑦}
女性:36.47%^{③②}
肺がん
男性:46.85%^{③⑨}
女性:37.79%^{③⑨}

特定健診受診率
46.81%^{③⑤}

特定保健指導実施率
21.94%^{②④}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:276.7g/日^{③④}
女性:269.9g/日^{②⑤}

食塩摂取量
男性:11.24g/日^{③⑧}
女性:8.98g/日^{①④}

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,829^{①③}
女性:7,357^③

スポーツ行動者率
男性:72.7%^{②⑩}
女性:60.7%^{③①}

<肥満>

BMI平均値
男性:23.7^⑩
女性:22.4^{①⑤}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:21.6^{①③}
女性:7.8^{①①}
人口10万対気分障害受療率
104^{③②}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 148.9^{②④}

高齢者就業率
男性:50.89%^{③①}
女性:32.62%^{③①}

独居高齢者率
男性:12.68%^{③③}
女性:23.03%^{③⑤}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:31.7%^{③②}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.6^⑧
一人平均むし歯数(3歳児)
0.42^⑨

山口県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.25^{②④}
女性:74.71^{①⑥}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:500.1^{③③}
女性:264.1^{③⑧}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:167.0^{③①} 女性:91.7^{④②}

年齢調整済み要介護認定率
12.7%^{①⑤}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:16.9^④
女性:7.3^⑧

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:37.9^{②⑤}
女性:21.2^{②⑥}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.8^{②⑥}
女性:1.3^{④①}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.8^{④①}
女性:4.3^{②⑨}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.6^{③⑥}
女性:2.0^{①①}

新規透析導入患者数(人口100万対)
315.3^{②⑦}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.27%^{①③}
予備群:11.51%^{①②}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:21.01%^{③④}
女性:16.66%^{③⑧}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.47%^{④③}
女性:5.43%^{④⑤}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.60%^{①⑩}
女性:5.07%^{③②}

特定健診受診率
42.81%^{④⑤}

特定保健指導実施率
18.01%^{③④}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:43.48%^{③⑨}
女性:29.90%^{④④}
大腸がん
男性:39.13%^{④②}
女性:29.21%^{④⑦}
肺がん
男性:50.00%^{③①}
女性:37.46%^{④①}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:270.0g/日^{④①}
女性:247.5g/日^{④①}

食塩摂取量
男性:10.70g/日^{②②}
女性:8.66g/日^⑥

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,817^{①④}
女性:6,969^{①①}

スポーツ行動者率
男性:71.9%^{②⑥}
女性:60.3%^{③②}

<肥満>

BMI平均値
男性:23.9^{②①}
女性:22.1^⑦

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:25.2^{③②}
女性:9.3^{③③}
人口10万対気分障害受療率
126^{④①}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 146.9^{①⑥}

高齢者就業率
男性:50.69%^{③④}
女性:33.89%^{②②}

独居高齢者率
男性:12.63%^{③②}
女性:24.21%^{④①}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:29.5%^{②③}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.8^{②④}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.64^{③③}

徳島県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.36^④
女性:73.4^④

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:510.5^⑦
女性:258.9^③

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:160.1^⑪ 女性:78.1^③

年齢調整済み要介護認定率
13.2%^②

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:18.8^⑦
女性:7.4^⑩

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:40.3^③
女性:20.1^⑨

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:10.7^④
女性:1.0^②

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.2^③
女性:5.2^④

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.1^③
女性:2.8^③

新規透析導入患者数(人口100万対)
390.3^④

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:15.68%^③
予備群:12.12%^③

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:20.80%^③
女性:16.91%^④

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.62%^⑦
女性:4.83%^③

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.28%^②
女性:4.75%^②

<がん検診受診率>

胃がん
男性:37.50%^④
女性:32.50%^④
大腸がん
男性:35.53%^④
女性:32.50%^④
肺がん
男性:42.76%^④
女性:38.13%^③

特定健診受診率
46.34%^③

特定保健指導実施率
30.64%^②

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:312.6g/日^⑧
女性:309.0g/日^③

食塩摂取量
男性:10.19g/日^⑥
女性:9.06g/日^②

<身体活動・運動>

歩数
男性:6,791^④
女性:6,313^③

スポーツ行動者率
男性:70.3%^③
女性:61.0%^②

<肥満>
BMI平均値
男性:24.0^③
女性:22.1^⑤

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:23.2^⑩
女性:8.4^⑪
人口10万対気分障害受療率
44^①

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 151.2^③

高齢者就業率
男性:45.96%^④
女性:32.11%^③

独居高齢者率
男性:12.61%^③
女性:20.30%^②

<たばこ>
習慣的喫煙者
男性:26.3%^⑤

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
1.0^③
一人平均むし歯数(3歳児)
0.61^②

香川県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.98^{③⑩}
女性:73.74^{④⑩}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:478.8^⑩
女性:249.8^⑨

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:159.6^⑮ 女性:79.1^④

年齢調整済み要介護認定率
13.2%^{②⑨}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:21^⑨
女性:8.9^⑮

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:37.6^{②③}
女性:18.1^⑦

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.0^{③⑩}
女性:0.8^⑪

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.0^{②⑧}
女性:4.5^{③⑩}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:7.1^{④③}
女性:3.4^{④⑤}

新規透析導入患者数(人口100万対)
370.2^{③⑨}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:15.88%^{③⑥}
予備群:11.36%^⑧

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:19.64%^{②⑩}
女性:16.50%^{③⑦}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.98%^{②⑪}
女性:4.70%^{②④}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.17%^{②⑦}
女性:4.56%^{①⑦}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:51.02%^{①⑩}
女性:40.85%^{①⑪}
大腸がん
男性:49.49%^⑧
女性:43.19%^{①⑩}
肺がん
男性:60.20%^⑥
女性:50.70%^{①⑩}

特定健診受診率
49.61%^{②⑤}

特定保健指導実施率
27.97%^⑦

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:284.9g/日^{②④}
女性:260.9g/日^{③③}

食塩摂取量
男性:10.57g/日^{①⑤}
女性:8.57g/日^⑤

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,696^{①⑦}
女性:6,260^{③④}

スポーツ行動者率
男性:71.2%^{③②}
女性:61.0%^{②⑨}

<肥満>

BMI平均値
男性:24.1^{③④}
女性:22.8^{②⑦}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:21.3^{①①}
女性:8.7^{②④}
人口10万対気分障害受療率
99^{③①}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 148.7^{②③}

高齢者就業率
男性:49.74%^{③⑧}
女性:34.12%^{②⑪}

独居高齢者率
男性:12.15%^{②⑥}
女性:20.38%^{③⑩}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:26.5%^⑥

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.9^{②⑦}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.61^{②⑦}

愛媛県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.58^{④③}
女性:74.1^{③①}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:516.8^{④①}
女性:254.2^{②⑤}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:169.0^{③④} 女性:80.8^⑦

年齢調整済み要介護認定率
13.3%^{③④}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:21.9^⑩
女性:7.3^⑧

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:38.6^{②⑨}
女性:20.0^⑩

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.9^{②⑦}
女性:0.8^{①①}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.6^{④⑩}
女性:4.3^{②⑨}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.1^{③⑩}
女性:1.8^②

新規透析導入患者数(人口100万対)
398.8^{④⑤}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:15.23%^{②⑥}
予備群:11.69%^{②①}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:23.08%^{④④}
女性:17.94%^{④④}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.81%^{①③}
女性:4.90%^{③⑥}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.70%^{①④}
女性:4.09%^⑦

特定健診受診率
42.98%^{④④}

特定保健指導実施率
24.14%^{①⑤}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:42.96%^{④①}
女性:32.55%^{③⑨}
大腸がん
男性:42.96%^{③①}
女性:36.24%^{③⑤}
肺がん
男性:51.41%^{②⑧}
女性:39.60%^{③③}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:273.2g/日^{③⑧}
女性:262.1g/日^{③⑩}

食塩摂取量
男性:10.66g/日^{②⑩}
女性:9.13g/日^{②⑤}

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,845^{①②}
女性:6,945^{①③}

スポーツ行動者率
男性:72.2%^{②③}
女性:61.9%^{②⑤}

<肥満>

BMI平均値
男性:24.1^{③⑦}
女性:23.1^{④⑩}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:24.9^{③①}
女性:9.4^{③⑤}
人口10万対気分障害受療率
112^{③⑤}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 151.1^{③⑦}

高齢者就業率
男性:49.39%^{④⑩}
女性:33.35%^{②⑥}

独居高齢者率
男性:12.85%^{③⑤}
女性:24.25%^{④①}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:29.9%^{②⑥}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.7^{①⑤}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.62^{③②}

高知県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.16^④
女性:74.2^②

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:506.3^③
女性:244.7^⑪

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:172.7^⑦ 女性:83.8^⑩

年齢調整済み要介護認定率
12.7%^⑮

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:36.1^④
女性:11.7^③

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:37.6^②
女性:20.2^②

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.9^⑦
女性:0.7^⑥

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.8^④
女性:4.4^③

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.1^③
女性:2.1^④

新規透析導入患者数(人口100万対)
465.0^④

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:16.53%^④
予備群:12.22%^③

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:21.79%^③
女性:16.26%^③

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.28%^③
女性:4.14%^⑥

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.51%^③
女性:5.03%^③

特定健診受診率
48.18%^③

特定保健指導実施率
17.97%^③

<がん検診受診率>

胃がん
男性:47.92%^②
女性:42.58%^⑦
大腸がん
男性:43.06%^②
女性:40.65%^⑨
肺がん
男性:54.17%^②
女性:52.26%^⑦

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:310.4g/日^⑩
女性:296.2g/日^⑦

食塩摂取量
男性:9.81g/日^②
女性:8.39g/日^③

<身体活動・運動>

歩数
男性:5,647^④
女性:5,840^④

スポーツ行動者率
男性:67.3%^④
女性:58.6%^④

<肥満>

BMI平均値
男性:25.1^④
女性:22.8^③

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:21.2^⑧
女性:6.4^③
人口10万対気分障害受療率
95^⑦

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 148.2^②

高齢者就業率
男性:47.63%^④
女性:37.42%^⑧

独居高齢者率
男性:16.03%^④
女性:26.43%^④

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:28.9%^⑨

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
1.0^②
一人平均むし歯数(3歳児)
0.47^⑮

福岡県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.67^④
女性:73.84^③

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:486.6^②
女性:254.0^②

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:175.0^④ 女性:93.7^④

年齢調整済み要介護認定率
13.1%^⑤

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:18.4^⑥
女性:7.2^⑥

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:33.6^⑥
女性:17.7^④

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:6.6^⑤
女性:1.2^③

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.6^⑩
女性:3.9^⑩

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.7^④
女性:2.5^④

新規透析導入患者数(人口100万対)
314.1^⑥

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:15.01%^②
予備群:12.05%^③

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:19.86%^②
女性:14.62%^⑦

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.62%^④
女性:5.27%^④

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.91%^③
女性:4.82%^③

<がん検診受診率>

胃がん
男性:43.89%^③
女性:33.39%^③
大腸がん
男性:40.98%^④
女性:32.53%^④
肺がん
男性:46.09%^④
女性:36.48%^④

特定健診受診率
47.23%^③

特定保健指導実施率
19.28%^③

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:320.2g/日^④
女性:276.2g/日^⑩

食塩摂取量
男性:11.72g/日^④
女性:9.51g/日^④

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,474^②
女性:7,155^⑧

スポーツ行動者率
男性:70.0%^③
女性:62.0%^③

<肥満>
BMI平均値
男性:24.0^⑦
女性:21.8^①

<こころの健康>
人口10万対自殺死亡率
男性:23.0^⑩
女性:8.3^⑩
人口10万対気分障害受療率
216^④

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 149.2^⑥

高齢者就業率
男性:48.45%^④
女性:30.43%^③

独居高齢者率
男性:13.97%^④
女性:24.15%^③

<たばこ>
習慣的喫煙者
男性:26.6%^⑦

<歯の健康>
一人平均むし歯数(12歳児)
1.0^③
一人平均むし歯数(3歳児)
0.53^⑦

佐賀県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.03^{②⑨}
女性:74.3^{②⑦}

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:491.9^{②⑥}
女性:257.8^{③⑩}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:172.9^{③⑨} 女性:87.5^{③②}

年齢調整済み要介護認定率
11.7%^③

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:14.8^①
女性:5.5^①

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:38.4^{②⑦}
女性:20.7^{②①}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.7^{④②}
女性:1.3^{④④}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.1^{③②}
女性:4.3^{②⑨}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.6^{③⑤}
女性:2.5^{②④}

新規透析導入患者数(人口100万対)
296.1^{①⑨}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.84%^{②⑨}
予備群:12.70%^{④⑥}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:17.97%^⑤
女性:13.49%^⑤

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.11%^{②⑧}
女性:4.80%^{③⑩}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:10.34%^{④③}
女性:6.05%^{④⑤}

特定健診受診率
48.68%^{②⑦}

特定保健指導実施率
30.38%^③

<がん検診受診率>

胃がん
男性:46.01%^{②⑧}
女性:39.11%^{①⑧}
大腸がん
男性:41.10%^{③⑨}
女性:35.75%^{③⑦}
肺がん
男性:49.69%^{③②}
女性:46.37%^{②③}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:289.2g/日^{①⑨}
女性:252.3g/日^{③⑨}

食塩摂取量
男性:10.58g/日^{①⑥}
女性:8.75g/日^⑨

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,283^{②⑦}
女性:6,635^{②①}

スポーツ行動者率
男性:68.0%^{④①}
女性:59.3%^{③⑧}

<肥満>

BMI平均値
男性:23.7^{①⑦}
女性:22.8^{③③}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:22.0^{①④}
女性:6.1^②
人口10万対気分障害受療率
131^{④⑤}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 153.7^{④⑤}

高齢者就業率
男性:54.79%^{①⑧}
女性:37.90%^⑥

独居高齢者率
男性:9.36%^⑥
女性:16.67%^{①③}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:33.2%^{③⑥}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
0.7^{①⑤}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.78^{④④}

長崎県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.67^④
女性:73.79^③

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:496.7^②
女性:256.4^②

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:172.8^③ 女性:91.0^④

年齢調整済み要介護認定率
13.1%^⑤

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:28.2^⑤
女性:10.8^⑥

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:34.0^⑨
女性:19.3^⑭

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.5^③
女性:1.2^⑪

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:7.9^⑦
女性:4.2^⑭

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:4.5^⑧
女性:1.8^②

新規透析導入患者数(人口100万対)
336.0^③

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:15.75%^③
予備群:12.08%^③

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:23.50%^④
女性:18.28%^④

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.72%^⑩
女性:4.46%^⑩

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:8.62%^⑪
女性:4.76%^⑪

特定健診受診率
44.59%^④

特定保健指導実施率
27.71%^⑧

<がん検診受診率>

胃がん
男性:40.29%^④
女性:32.15%^④
大腸がん
男性:37.77%^④
女性:31.19%^④
肺がん
男性:43.88%^④
女性:37.30%^④

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:269.1g/日^④
女性:248.6g/日^④

食塩摂取量
男性:10.52g/日^⑬
女性:8.71g/日^⑧

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,061^⑤
女性:6,929^⑭

スポーツ行動者率
男性:70.6%^③
女性:59.1%^③

<肥満>

BMI平均値
男性:23.6^⑨
女性:22.9^③

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:23.0^⑩
女性:7.1^⑦
人口10万対気分障害受療率
114^⑦

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 152.1^④

高齢者就業率
男性:50.61%^③
女性:32.57%^③

独居高齢者率
男性:12.01%^⑤
女性:22.46%^④

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:35.3%^④

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
1.0^③
一人平均むし歯数(3歳児)
0.74^④

熊本の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.68^⑩
女性:74.41^⑫

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:466.6^⑧
女性:240.7^④

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:154.5^⑦ 女性:81.0^⑧

年齢調整済み要介護認定率
13.2%^⑳

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:16.2^②
女性:6.3^③

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:33.9^⑧
女性:19.2^⑬

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:7.1^⑩
女性:0.9^⑱

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.4^⑨
女性:4.8^{④③}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:4.6^⑩
女性:1.9^⑦

新規透析導入患者数(人口100万対)
316.7^㉑

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:16.24%^{④①}
予備群:12.42%^{④②}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:20.90%^{③③}
女性:15.54%^{②⑤}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.71%^⑨
女性:4.24%^⑩

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:10.78%^{④⑥}
女性:5.50%^{③⑧}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:51.00%^⑪
女性:40.16%^⑭
大腸がん
男性:43.02%^{③②}
女性:38.56%^{②⑥}
肺がん
男性:49.57%^{③④}
女性:44.95%^{②⑥}

特定健診受診率
46.72%^{③⑥}

特定保健指導実施率
28.37%^⑥

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:286.5g/日^{②③}
女性:273.9g/日^{②①}

食塩摂取量
男性:10.70g/日^{②③}
女性:9.30g/日^{③①}

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,200^{③①}
女性:6,465^{②⑧}

スポーツ行動者率
男性:72.0%^{②④}
女性:62.0%^{②③}

<肥満>

BMI平均値
男性:24.0^{②⑧}
女性:22.9^{③⑤}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:27.4^{④①}
女性:7.8^{①①}
人口10万対気分障害受療率
113^{③⑥}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 146.9^{①⑥}

高齢者就業率
男性:50.98%^{②⑨}
女性:35.71%^{①⑤}

独居高齢者率
男性:11.00%^{①⑧}
女性:20.08%^{②⑧}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:38.5%^{④⑦}

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
1.1^{④②}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.77^{④③}

大分県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:70.98^⑩
女性:74.53^⑫

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:464.9^⑦
女性:243.7^⑨

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:151.0^④ 女性:80.3^⑥

年齢調整済み要介護認定率
11.9%^④

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:31.3^⑪
女性:11.4^⑧

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:34.2^⑩
女性:18.8^⑧

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.4^⑬
女性:1.2^⑪

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:7.4^⑪
女性:4.4^⑬

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:5.7^⑫
女性:2.5^⑫

新規透析導入患者数(人口100万対)
381.1^⑫

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:14.91%^⑫
予備群:11.94%^⑫

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:20.87%^⑬
女性:15.69%^⑫

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:4.19%^⑬
女性:4.88%^⑬

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.68%^⑭
女性:5.63%^⑭

<がん検診受診率>

胃がん
男性:49.35%^⑮
女性:39.29%^⑮
大腸がん
男性:42.42%^⑮
女性:36.51%^⑮
肺がん
男性:54.11%^⑮
女性:46.03%^⑮

特定健診受診率
54.04%^⑫

特定保健指導実施率
24.24%^⑭

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:299.8g/日^⑮
女性:262.8g/日^⑮

食塩摂取量
男性:10.44g/日^⑮
女性:8.84g/日^⑮

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,599^⑮
女性:6,954^⑮

スポーツ行動者率
男性:72.8%^⑮
女性:62.1%^⑮

<肥満>

BMI平均値
男性:23.8^⑮
女性:22.5^⑮

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:20.2^⑮
女性:10.0^⑮
人口10万対気分障害受療率
123^⑮

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 149.5^⑮

高齢者就業率
男性:51.33%^⑮
女性:34.13%^⑮

独居高齢者率
男性:11.69%^⑮
女性:22.23%^⑮

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:25.3%^⑮

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
1.4^⑮
一人平均むし歯数(3歳児)
0.72^⑮

宮崎県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.62^⑬
女性:74.97^⑧

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:498.7^⑳
女性:257.7^㉑

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:165.1^㉒ 女性:86.1^㉓

年齢調整済み要介護認定率
11.6%^㉔

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:24.3^㉕
女性:9.1^㉖

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:42.2^㉗
女性:26.3^㉘

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.2^㉙
女性:1.6^㉚

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.0^㉛
女性:3.9^㉜

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:5.6^㉝
女性:2.5^㉞

新規透析導入患者数(人口100万対)
415.1^㉟

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:15.54%^㊲
予備群:12.56%^㊳

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:20.56%^㊴
女性:16.35%^㊵

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.51%^㊶
女性:4.20%^㊷

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.60%^㊸
女性:5.45%^㊹

<がん検診受診率>

胃がん
男性:44.91%^㊺
女性:35.86%^㊻
大腸がん
男性:42.59%^㊼
女性:35.44%^㊽
肺がん
男性:50.93%^㊾
女性:44.73%^㊿

特定健診受診率
44.78%^㊿

特定保健指導実施率
28.58%^㊿

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:291.7g/日^㊿
女性:277.8g/日^㊿

食塩摂取量
男性:10.72g/日^㊿
女性:9.45g/日^㊿

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,022^㊿
女性:5,939^㊿

スポーツ行動者率
男性:69.8%^㊿
女性:59.8%^㊿

<肥満>

BMI平均値
男性:24.8^㊿
女性:23.8^㊿

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:27.5^㊿
女性:8.0^㊿
人口10万対気分障害受療率
93^㊿

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 150.9^㊿

高齢者就業率
男性:50.81%^㊿
女性:36.77%^㊿

独居高齢者率
男性:12.79%^㊿
女性:24.07%^㊿

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:28.1%^㊿

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
1.0^㊿
一人平均むし歯数(3歳児)
0.77^㊿

鹿児島県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.68^⑩
女性:74.85^⑬

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:512.4^{③⑨}
女性:264.7^{③⑨}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:161.4^{②①} 女性:85.6^{②③}

年齢調整済み要介護認定率
12.6%^⑫

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:26.5^{②①}
女性:11.8^{③⑥}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:44.1^{③⑨}
女性:27.5^{④④}

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:8.3^{③④}
女性:1.3^{④①}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:8.0^{②⑧}
女性:4.7^{③⑨}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:7.2^{④⑤}
女性:2.9^{③⑦}

新規透析導入患者数(人口100万対)
393.0^{④④}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:16.31%^{④①}
予備群:12.47%^{④①}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:22.14%^{④②}
女性:16.76%^{③⑨}

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.88%^{①⑥}
女性:4.72%^{②⑥}

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:10.21%^{④①}
女性:5.73%^{④③}

<がん検診受診率>

胃がん
男性:47.48%^{②③}
女性:36.75%^{②⑥}
大腸がん
男性:44.51%^{②⑤}
女性:38.46%^{②⑧}
肺がん
男性:56.68%^{①④}
女性:52.14%^{②⑧}

特定健診受診率
48.19%^{②⑨}

特定保健指導実施率
25.09%^{①⑩}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:279.4g/日^{③①}
女性:254.3g/日^{③⑥}

食塩摂取量
男性:11.32g/日^{④①}
女性:9.34g/日^{③③}

<身体活動・運動>

歩数
男性:7,296^{②⑥}
女性:6,700^{②①}

スポーツ行動者率
男性:73.5%^{①②}
女性:63.5%^{①⑥}

<肥満>
BMI平均値
男性:24.5^{④②}
女性:22.8^{②⑧}

<こころの健康>
人口10万対自殺死亡率
男性:23.5^{②③}
女性:7.7^{①①}
人口10万対気分障害受療率
95^{②⑦}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 149.8^{③①}

高齢者就業率
男性:50.62%^{③⑤}
女性:34.71%^{①⑥}

独居高齢者率
男性:15.18%^{④③}
女性:28.70%^{④⑦}

<たばこ>
習慣的喫煙者
男性:28.6%^{①⑦}

<歯の健康>
一人平均むし歯数(12歳児)
1.0^{③②}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.64^{③④}

沖縄県の予防・健康に関する指標の現状

健康寿命

健康寿命 男性:71.64^⑫
女性:74.89^⑪

死亡・介護・重症化

全死因
年齢調整死亡率 男性:498.4^{③①}
女性:251.7^{②①}

がん(悪性新生物)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:153.0^⑥ 女性:86.2^{②⑥}

年齢調整済み要介護認定率
13.7%^{④③}

<循環器疾患>

虚血性心疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:35.4^{④⑨}
女性:11.5^{③①}

脳血管疾患
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:38.1^{②⑥}
女性:17.5^③

慢性閉そく性肺疾患(COPD)
年齢調整死亡率(人口10万対)
男性:9.3^{④⑤}
女性:1.6^{④⑦}

<糖尿病合併症>

腎不全
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.8^⑬
女性:4.2^{②④}

糖尿病
年齢調整死亡率
(人口10万対)
男性:6.7^{④①}
女性:3.9^{④⑦}

新規透析導入患者数(人口100万対)
308.4^{②②}

生活習慣病

<特定健診結果>

メタボリックシンドローム
該当者:18.08%^{④⑦}
予備群:14.78%^{④⑦}

高血圧
(収縮期140mmHg以上)
男性:18.61%^⑬
女性:14.38%^⑭

脂質異常症
(LDL180mm/dL以上)
男性:3.86%^⑭
女性:4.39%^⑬

糖尿病
(HbA1c6.5%以上)
男性:9.68%^{③②}
女性:5.76%^{④④}

特定健診受診率
49.77%^{②④}

特定保健指導実施率
32.49%^①

<がん検診受診率>

胃がん
男性:43.94%^{③⑤}
女性:39.19%^{①⑦}
大腸がん
男性:36.68%^{④⑥}
女性:34.80%^{③⑨}
肺がん
男性:45.33%^{④③}
女性:41.55%^{②⑨}

生活習慣・社会環境

<食生活>

野菜摂取量
男性:272.5g/日^{④④}
女性:268.0g/日^{②⑥}

食塩摂取量
男性:9.13g/日^①
女性:7.98g/日^①

<身体活動・運動>

歩数
男性:6,850^{③⑨}
女性:6,052^{④④}

スポーツ行動者率
男性:74.0%^⑪
女性:62.1%^{②②}

<肥満>

BMI平均値
男性:24.1^{③⑤}
女性:23.8^{④⑤}

<こころの健康>

人口10万対自殺死亡率
男性:28.6^{④⑤}
女性:8.5^{②②}
人口10万対気分障害受療率
91^{②③}

<生活・労働環境>

年平均労働時間
(月間) 149.3^{②⑦}

高齢者就業率
男性:42.42%^{④⑦}
女性:28.30%^{④③}

独居高齢者率
男性:16.15%^{④⑤}
女性:20.50%^{③①}

<たばこ>

習慣的喫煙者
男性:27.2%^⑨

<歯の健康>

一人平均むし歯数(12歳児)
1.8^{④⑦}
一人平均むし歯数(3歳児)
0.87^{④⑥}